

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|------------------------|----------|
| <i>Micropterix calthella</i> (Linnaeus, 1761) | III |  6 mm | | |
| <i>Micropterix aruncella</i> (Scopoli, 1763) | IV |  5 mm | | |
| <i>Micropterix myrtetella</i> Zeller, 1850 | II |  | | |
| <i>Micropterix aureatella</i> (Scopoli, 1763) | III |  8 mm | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|------------------------|----------|
| <i>Micropterix osthelderi</i> Heath, 1975 | III |  9 mm | | |
| <i>Micropterix schaefferi</i> Heath, 1975 | III |  8 mm | | |
| <i>Micropterix mansuetella</i> Zeller, 1844 | II ? |  7 mm | | |
| <i>Micropterix tunbergella</i> (Fabricius, 1787) | III |  7 mm | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|--|--------------------|
| <i>Dyseriocraania subpurpurella</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Quercus |
| <i>Paracraania chrysolepidella</i> Zeller, 1851 | II |  |  | Carpinus, Corylus? |
| <i>Heringocraania unimaculella</i> (Zetterstedt, 1839) | IV |  |  | Betula |
| <i>Heringocraania sparrmannella</i> (Bosc, 1791) | II |  |  | Betula |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|----------|
| <i>Heringocrania salopiella</i> (Stainton, 1854) | II | | | Betula |
| <i>Heringocrania cicatricella</i> (Zetterstedt, 1839) | III | | | Betula |
| <i>Heringocrania sangii</i> (Wood, 1891) | II | | | Betula |
| <i>Heringocrania semipurpurella</i> (Stephens, 1835) | III | | | Betula |
| <i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761) | IV | | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|----------|
| <i>Pharmacis lupulina</i> (Linnaeus, 1758) | IH |  Germania cent. Ung.-Jura / Thür. Neuhofen v. Wf 34.S.89 E. Friedrich Bild12805 |  | |
| <i>Pharmacis fusconebulosa</i> (De Geer, 1778) | III |  Germania or. Ung.-Nieds. Mausbach 16.06.1998 a.L. E. Friedrich Bild12810 |  | |
| <i>Phymatopus hecta</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  Germania cent. Ung.-Jura / Thür. Sperrgrund Af 14.7.2005 E. Friedrich Bild12819 | | |
| <i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758) | III |  Germania cent. Ung.-Jura / Thür. Kappelroda 22.5.1992 a.L. E. Friedrich Bild12826 |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|------------------------|--|
| <i>Enteucha acetosae</i> (Stainton, 1854) | II | | | Rumex acetosa, R. acetosella, R. thrysiflora |
| <i>Stigmella naturella</i> (Klimesch, 1936) | I | A small rectangular label below the moth contains the following text: O Austria, Wien 48°16'N, 16°21'E G Kahlenbergsdorf Betula pendula 29.VIII.-e. 21.IX.2010 | | Betula |
| <i>Stigmella lapponica</i> (Wocke, 1862) | II | | | Betula |
| <i>Stigmella confusella</i> (Wood et Walsingham, 1894) | I | | | Betula |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|--|
| <i>Stigmella freyella</i> (Heyden, 1858) | II |  |  | Cyonvolvulus arvensis, Calystegia sepium |
| <i>Stigmella tiliae</i> (Frey, 1856) | IV |  |  | Tilia |
| <i>Stigmella betulicola</i> (Stainton, 1856) | IV |  |  | Betula |
| <i>Stigmella nivenburgensis</i> (Preissecker, 1942) | II |  |  | Salix euxina, S. alba, S. triandra |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|--------------------------|
| <i>Stigmella sakhalinella</i> Puplesis, 1984 | II |  |  | Betula |
| <i>Stigmella luteella</i> (Stainton, 1857) | III |  |  | Betula |
| <i>Stigmella glutinosae</i> (Stainton, 1858) | III |  |  | Alnus glutinosa, Betula? |
| <i>Stigmella alnetella</i> (Stainton, 1856) | III |  |  | Alnus glutinosa, Betula? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|--|
| <i>Stigmella microtheriella</i> (Stainton, 1854) | IV | | | Carpinus, Corylus |
| <i>Stigmella prunetorum</i> (Stainton, 1855) | III | | | Prunus sp. div. |
| <i>Stigmella aceris</i> (Frey, 1857) | III | | | Acer platanoides, A. campestre, A. tataricum |
| <i>Stigmella malella</i> (Stainton, 1854) | III | | | Malus sp. div. |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|--|--|
| <i>Stigmella rhamnella</i> (Herrich-Schäffer, 1860) | II |  |  | Rhamnus |
| <i>Stigmella catharticella</i> (Stainton, 1853) | |  |  | Rhamnus |
| <i>Stigmella centifoliella</i> (Zeller, 1848) | IV |  |  | Rosa sp. div., Sanguisorba minor, S. officinalis |
| <i>Stigmella anomalella</i> (Goeze, 1783) | |  |  | Rosa sp. div., Sanguisorba minor, S. officinalis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|------------------------------------|
| <i>Stigmella ulmivora</i> (Folgone, 1860) | III |  |  | Ulmus sp. div. |
| <i>Stigmella ulmiphaga</i> (Preissecker, 1942) | II |  | | Ulmus glabra, U. minor |
| <i>Stigmella viscerella</i> (Stainton, 1853) | II |  |  | Ulmus minor |
| <i>Stigmella sanguisorbae</i> (Wocke, 1865) | I |  | | Sanguisorba officinalis, S. minor? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|--|
| <i>Stigmella thuringiaca</i> (Petry, 1904) | III |  | | potentilla sp. div., Sanguisorba minor, Agrimonia eupatoria, Fragaria sp. div. |
| <i>Stigmella rolandi</i> Nieukerken, 1990 | II |  | | Rosa pimpinellifolia, R. rugosa, Sanguisorba minor |
| <i>Stigmella paradoxa</i> (Frey, 1858) | II |  |  | Crataegus sp. div. |
| <i>Stigmella regiella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II |  |  | Crataegus sp. div. |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|----------------------------|
| <i>Stigmella crataegella</i> (Klimesch, 1936) | III |  |  | Crataegus sp. div. |
| <i>Stigmella hahniella</i> (Wörz, 1937) | I |  | | Sorbus (Hahnia) torminalis |
| <i>Stigmella magdalena</i> (Klimesch, 1950) | III |  |  | Sorbus aucuparia |
| <i>Stigmella nylandriella</i> (Tengström, 1848) | III |  |  | Sorbus aucuparia |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---------|------------------------|--|
| <i>Stigmella oxyacanthella</i> (Stainton, 1854) | IV | | | Crataegus, Cotoneaster, Malus, Pyrus, Prunus, Sorbus |
| <i>Stigmella pyri</i> (Glitz, 1865) | II | | | Pyrus |
| <i>Stigmella minusculella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II | | | Pyrus, Sorbopyrus |
| <i>Stigmella stettinensis</i> (Heinemann, 1871) | II | | | Pyrus communis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|---|
| <i>Stigmella desperatella</i> (Frey, 1856) | IV |  |  | Malus, Pyrus |
| <i>Stigmella hybnerella</i> (Hübner, 1796) | III |  |  | Crataegus, Malus, Pyrus, Amelanchier, Cotoneaster, Pyracantha, Sorbus |
| <i>Stigmella mespilicola</i> (Frey, 1856) | II |  | | Sorbus, Amelanchier, Cotoneaster |
| <i>Stigmella floslactella</i> (Haworth, 1828) | III |  |  | Corylus, Carpinus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|--|---|--|
| <i>Stigmella carpinella</i> (Heinemann, 1862) | II |  |  | Carpinus |
| <i>Stigmella tityrella</i> (Stainton, 1854) | III |  |  | Fagus |
| <i>Stigmella salicis</i> (Stainton, 1854) | IV |  |  | Salix sp. div. |
| <i>Stigmella vimineticola</i> (Frey, 1856) | II ? |  | | Salix eleagnos, rozhodně i jiné druhy vrb, např. S. purpurea |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|------------------------------------|
| <i>Stigmella myrtillella</i> (Stainton, 1857) | II |  |  | Vaccinium uliginosum, V. myrtillus |
| <i>Stigmella zelleriella</i> (Snellen, 1875) | I |  | | Salix repens, S. lapponum |
| <i>Stigmella obliquella</i> (Heinemann, 1862) | III |  |  | Salix sp. div. |
| <i>Stigmella pallidiciliella</i> (Klimesch, 1946) | I |  | | Salix purpurea |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Stigmella trimaculella</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Populus sp. div. |
| <i>Stigmella assimilella</i> (Zeller, 1848) | II |  |  | Populus tremula, P. alba? |
| <i>Stigmella sorbi</i> (Stainton, 1861) | II |  |  | Sorbus aucuparia |
| <i>Stigmella plagicolella</i> (Stainton, 1854) | IV |  |  | Prunus sp. div. - housenka žlutavá oproti E. spinosella |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|----------------------------------|
| <i>Stigmella lemniscella</i> (Zeller, 1839) | III |  |  | Ulmus sp. div. |
| <i>Stigmella continuella</i> (Stainton, 1856) | I |  |  | Betula sp. div. |
| <i>Stigmella aurella</i> (Fabricius, 1775) | III |  |  | Rubus, Agrimonia, Fragaria, Geum |
| <i>Stigmella splendidissimella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | IV |  |  | Rubus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---------------------------------|
| <i>Stigmella pretiosa</i> (Heinemann, 1862) | II |  |  | Geum rivale, G. urbanum |
| <i>Stigmella aeneofasciella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | III |  |  | Agrimonia, Fragaria, Potentilla |
| <i>Stigmella tormentillella</i> (Herrich-Schäffer, 1860) | I |  | | Potentilla sp. div. |
| <i>Stigmella poterii</i> (Stainton, 1857) | II |  |  | Sanguisorba, Potentilla |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|--|--------------------------------------|
| <i>Stigmella filipendulae</i> (Wocke, 1871) | I |  |  | Filipendula officinalis, F. vulgaris |
| <i>Stigmella lediella</i> (Schleich, 1867) | I |  |  | Ledum palustre |
| <i>Stigmella speciosa</i> (Frey, 1858) | II |  |  | Acer pseudoplatanus |
| <i>Stigmella perpygmaeella</i> (Doubleday, 1859) | II |  |  | Crataegus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|--------------------|
| <i>Stigmella incognitella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II |  |  | Malus |
| <i>Stigmella hemargyrella</i> (Kollar, 1832) | III |  |  | Fagus |
| <i>Stigmella lonicerarum</i> (Frey, 1857) | II |  |  | Lonicera xylosteum |
| <i>Stigmella basiguttella</i> (Heinemann, 1862) | III |  |  | Fagus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|--|------------------|
| <i>Stigmella zangherii</i> (Klimesch, 1951) | I |  | | Quercus cerris |
| <i>Stigmella szoecsiella</i> (Borkowski, 1972) | I |  | | Quercus cerris |
| <i>Stigmella dorsiguttella</i> (Johansson, 1971) | II |  | | Quercus sp. div. |
| <i>Stigmella ruficapitella</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Quercus sp. div. |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|-----------------------------------|
| <i>Stigmella atricapitella</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Quercus sp. div. |
| <i>Stigmella samiatella</i> (Zeller, 1839) | II |  |  | Quercuc sp. div., Castanea sativa |
| <i>Stigmella roborella</i> (Johansson, 1971) | III |  |  | Quercus sp. div. |
| <i>Stigmella eberhardi</i> (Johansson, 1971) | I |  | | Quercus sp. div. |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---|---|--|
| <i>Acalyptris loranthella</i> (Klimesch, 1937) | I |  | | Loranthus europaeus |
| <i>Glaucolepis melanoptera</i> Nieukerken et Puplesis, 1992 | II ? |  | | Prunus spinosa v hálkách na větvičkách |
| <i>Glaucolepis headleyella</i> (Stainton, 1854) | I |  |  | Prunella grandiflora |
| <i>Glaucolepis lituanica</i> (Ivinskis et van Nieuwerken, 2012) | I |  | | Salvia pratensis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|------------------------|---|
| <i>Glaucolepis thymi</i> (Szöcs, 1965) | II |  | | Thymus sp. div. |
| <i>Trifurcula cryptella</i> (Stainton, 1856) | III |  | | Lotus corniculatus, Securigera varia |
| <i>Trifurcula eurema</i> (Tutt, 1899) | III |  | | Lotus corniculatus, Tetragonolobus maritimus, Dorycnium |
| <i>Trifurcula austriaca</i> van Nieukerken, 1990 | I | | | Genista tinctoria |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|------------------------|-------------------------------------|
| <i>Trifurcula subnitidella</i> (Duponchel, 1843) | IH |  | | Lotus corniculatus - lodyžní hálky |
| | II |  | | Dorycnium - miny na lodyze |
| <i>Trifurcula josefklimeschi</i> van Nieukerken, 1990 | I | | | Onobrychis arenaria, O. viciifolia |
| | I | | | Cytisus nigricans - hálky na lodyze |
| <i>Trifurcula silviae</i> van Nieukerken, 1990 | | | | |
| <i>Trifurcula pallidella</i> (Duponchel, 1843) | II |  | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|------------------------|-------------------------------------|
| <i>Trifurcula immundella</i> (Zeller, 1839) | II |  | | Cytisus scoparius - miny na lodyze |
| <i>Trifurcula corothamni</i> Laštůvka et Laštůvka, 1994 | I | | | Cytisus procumbens - miny na lodyze |
| <i>Trifurcula moravica</i> Laštůvka et Laštůvka, 1994 | I | | | Cytisus nigricans - miny na lodyze |
| <i>Trifurcula chamaecytisi</i> Laštůvka et Laštůvka, | I |  | | Chamaecytisus austriacus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|--|
| <i>Trifurcula serotinella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | IH | | | Genistan sagittalis, G. tinctoria - miny na lodyze |
| <i>Trifurcula beirnei</i> Puplesis, 1984 | I ? | | | snad Genista sp. div. |
| <i>Parafomoria helianthemella</i> (Herrich-Schäffer, 1860) | I | | | Helianthemum nummularium, H. canum |
| <i>Bohemannia pulverosella</i> (Stainton, 1849) | III | | | Malus sylvestris |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|--|
| <i>Bohemannia auriciliella</i> (Joannis, 1908) | I ? |  |  | větvičky Betula? |
| <i>Bohemannia quadrimaculella</i> (Boheman, 1853) | I ? |  | | <i>Alnus glutinosa</i> - snad ve květních pupenech |
| <i>Etainia sericopeza</i> (Zeller, 1839) | III |  |  | <i>Acer platanoides</i> |
| <i>Etainia louisella</i> (Sircom, 1849) | III |  |  | <i>Acer campestre</i> |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|---|-----------------------|
| <i>Etainia decentella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | I |  |  | Acer pseudoplatanus |
| <i>Fomoria weaveri</i> (Stainton, 1855) | I |  |  | Vaccinium vitis-idaea |
| <i>Fomoria septembrella</i> (Stainton, 1849) | IV |  |  | Hypericum sp. div. |
| <i>Fomoria viridissimella</i> (Caradja, 1920) | I | | | Peucedanum cervaria |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|---------------------------|
| <i>Zimmermannia atrifrontella</i> (Stainton, 1851) | III |  |  | Quercus sp. div. |
| <i>Ectoedemia liebwerdella</i> Zimmermann, 1940 | III |  |  | Fagus |
| <i>Zimmermannia longicaudella</i> Klimesch, 1953 | II |  | | Quercus sp. div. |
| <i>Zimmermannia reichli</i> Laštůvka et Laštůvka, 1998 | ? |  | | živná rostlina není známa |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|--|
| <i>Zimmermannia amani</i> Svensson, 1966 | I |  | | Ulmus sp. div, zřejmě především U. minor (teplá stanoviště), minuje v zelené kůře větviček |
| <i>Ectoedemia intimella</i> (Zeller, 1848) | III |  |  | Salix sp. div. |
| <i>Ectoedemia hannoverella</i> (Glitz, 1872) | IV |  |  | Populus sp. div. |
| <i>Ectoedemia turbidella</i> (Zeller, 1848) | III |  |  | Populus alba - mina při střední žilce |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|---|
| <i>Ectoedemia klimeschi</i> (Skala, 1933) | II | | | Populus alba - mina mezi vedlejšími žilkami |
| <i>Ectoedemia argyropeza</i> (Zeller, 1839) | III | | | Populus tremula |
| <i>Ectoedemia preisseckeri</i> (Klimesch, 1941) | I | | | Ulmus minor |
| <i>Ectoedemia caradjai</i> (Groschke, 1944) | I | | | Quercus pubescens hlavně |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|--|
| <i>Ectoedemia gilvipennella</i> (Klimesch, 1946) | I |  | | Quercus cerris |
| <i>Ectoedemia rufifrontella</i> (Caradja, 1920) | I |  | | Quercus pubescens |
| <i>Ectoedemia albifasciella</i> (Heinemann, 1871) | III |  |  | Quercus sp. div. - mina bez otvoru ve spodní části |
| <i>Ectoedemia cerris</i> (Zimmermann, 1944) | I |  | | Quercus cerris |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|---|
| <i>Ectoedemia contorta</i> Nieukerken, 1985 | I |  | | Quercus pubescens |
| <i>Ectoedemia subbimaculella</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Quercus sp. div. - mina má na spodní straně otvor, kterým vypadává trus |
| <i>Ectoedemia heringi</i> (Toll, 1934) | III |  |  | Quercus sp. div., Castanea sativa - mina nemá otvor |
| <i>Ectoedemia liechtensteini</i> Zimmermann, 1944 | I |  | | Quercus cerris, Q. pubescens, Q. petraea |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|---|
| <i>Ectoedemia agrimoniae</i> (Frey, 1858) | I |  |  | Agrimonia eupatoria, A. procera |
| <i>Ectoedemia angulifasciella</i> (Stainton, 1849) | III |  |  | Rosa, Filipendula vulgaris? |
| <i>Ectoedemia arcuatella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II |  |  | Fragaria sp. div. |
| <i>Ectoedemia atricollis</i> (Stainton, 1857) | IV |  |  | Crataegus, Malus, Pyrus, Cotoneaster, Amelanchier, Sorbus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|-----------------------------------|
| <i>Ectoedemia rubivora</i> (Wocke, 1860) | II |  |  | Rubus sp. div. |
| <i>Ectoedemia spinosella</i> (Joannis, 1908) | II |  |  | Prunus sp. div. - housenka zelená |
| <i>Ectoedemia mahalebella</i> (Klimesch, 1936) | II |  | | Prunus sp. div. |
| <i>Ectoedemia occultella</i> (Linnaeus, 1767) | III |  |  | Betula sp. div. |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|---|
| <i>Ectoedemia minimella</i> (Zetterstedt, 1839) | I |  |  | Betula v červnu, září |
| <i>Opostega salaciella</i> (Treitschke, 1833) | I |  | | Rumex acetosella |
| <i>Opostega spatulella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I? |  | | Ulmus - v zelené kůře? |
| <i>Pseudopostega crepusculella</i> (Zeller, 1839) | I |  | | Mentha - miny v lodyze na vlhkých místech |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|--|
| <i>Pseudopostega auritella</i> (Hübner, 1813) | I |  | | pravděpodobně <i>Lycopus europaeus</i> - miny v lodyze |
| <i>Antispilina ludwigi</i> Hering, 1941 | I |  |  | <i>Polygonum bistorta</i> |
| <i>Antispila metallella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | <i>Cornus sanguinea</i> |
| <i>Antispila treitschkiella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1843) | II |  |  | Cornus mas v teplomilných doubravách |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Antispila petryi</i> Martini, 1899 | I |  | | Cornus sanguinea na xerotermních stanovištích |
| <i>Heliozela sericiella</i> (Haworth, 1828) | III |  |  | Quercus sp. div. |
| <i>Heliozela resplendella</i> (Stainton, 1851) | I |  |  | Alnus glutinosa |
| <i>Heliozela hammoniella</i> Sorhagen, 1885 | I |  |  | Betula pendula |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|--|
| <i>Coptodisca lucifluella</i> (Clemens, 1861) | IV |  |  | Juglans nigra, J. regia, Pterocarya fraxinifolia |
| <i>Coptodisca juglandiella</i> (Chambers, 1874) | IV |  |  | Juglans nigra |
| <i>Nemophora degeerella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  |  | Anemone nemorosa, Digitalis purpurea, detrit |
| <i>Nemophora congruella</i> Fischer von Röslerstamm, 1840 | I |  |  | detrit, vak z jehlic smrku, jedle |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|--|
| <i>Nemophora ochsenheimerella</i> (Hübner, 1813) | I |  |  | smíšené lesy se smrkem a jedlí, vak z listu buku |
| <i>Nemophora raddaella</i> (Hübner, 1813) | I |  |  | |
| <i>Nemophora metallica</i> (Poda, 1761) | II |  |  | Knautia arvensis - kvetenství |
| <i>Nemophora pfeifferella</i> (Hübner, 1813) | II |  |  | Dipsacus - kvetenství |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|--|-------------------|
| <i>Nemophora cupriacella</i> (Hübner, 1819) | II |  |  | Succisa, Scabiosa |
| <i>Nemophora violellus</i> (Stainton, 1851) | I |  |  | Gentiana |
| <i>Nemophora prodigellus</i> (Zeller, 1853) | I |  |  | Stachys, Betonica |
| <i>Nemophora fasciella</i> (Fabricius, 1775) | II |  |  | Ballota nigra |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|-----------------------------------|
| <i>Nemophora minimella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Succisa, Scabiosa |
| <i>Nemophora dumerilella</i> Duponchel, 1839 | I |  |  | <i>Pseudolysimachion spicatum</i> |
| <i>Nemophora associatella</i> Zeller, 1839 | I |  |  | <i>Abies alba</i> |
| <i>Adela croesella</i> (Scopoli, 1763) | II |  |  | <i>Ligustrum vulgare</i> |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|--------------|
| <i>Adela reaumurella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  |  | Rubus? |
| <i>Adela violella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |  |  | Hypericum |
| <i>Adela mazzolella</i> (Hübner, 1796) | III |  |  | Brassicaceae |
| <i>Adela cuprella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Salix |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|--|
| <i>Cauchas leucocerella</i> (Scopoli, 1763) | I |  |  | Pseudolysimachion ? |
| <i>Cauchas rufimitrella</i> (Scopoli, 1763) | III |  |  | Alliaria petiolata, Lunaria rediviva |
| <i>Cauchas fibulella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |  |  | Veronica chamaedrys |
| <i>Cauchas rufifrontella</i> (Treitschke, 1833) | I |  |  | Brassicaceae? Cardamine pratensis?, Thlaspi? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-------|---|--|--|
| <i>Nematopogon pilella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  | | detrit ve smíšených lesích |
| <i>Nematopogon schwarzellus</i> Zeller, 1839 | IV |  | | detrit ve smíšených lesích |
| <i>Nematopogon adansoniella</i> (de Villers, 1789) | III ? |  |  | tykadlo výrazně kroužkované oproti <i>N. swammerdamella</i> , viz níže |
| <i>Nematopogon metaxella</i> (Hübner, 1813) | III |  |  | rašelinné biotopy |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|-------------------------------|
| <i>Nematopogon swammerdamella</i> (Linnaeus, 1758) | IV | | | |
| <i>Nematopogon robertella</i> (Clerck, 1759) | III | | | jehličnaté lesy |
| <i>Alloclemensia mesospilella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) | I | | | Saxifraga rotundifolia |
| <i>Incurvaria pectinea</i> Haworth, 1828 | IV | | | Betula, Corylus, Alnus, Tilia |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|--|
| <i>Incurvaria masculella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  |  | Fagus, Quercus, Corylus, Castanea, Rosa, Malus, Tilia, Vaccinium myrtillus |
| <i>Incurvaria vetulella</i> (Zetterstedt, 1839) | I |  | | Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea |
| <i>Incurvaria oehlmanniella</i> (Hübner, 1796) | III |  |  | bylinky |
| <i>Incurvaria koernerella</i> (Zeller, 1839) | III |  16,5 mm |  | dubohabřiny, bučiny |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|---|
| <i>Incurvaria praelatella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Geum rivale, G. Urbanum, Fragaria, Rubus, Filipendula ulmaria, Alchemilla |
| <i>Phylloporia bistrigella</i> (Haworth, 1828) | I |  |  | Betula pubescens, B. pendula |
| <i>Lampronia redimitella</i> (Lienig et Zeller, 1846) | I |  |  | Ribes sp. div. |
| <i>Lampronia morosa</i> Zeller, 1852 | II |  | | Rosa canina |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|-------------------------------|
| <i>Lampronia provectella</i> (Heyden, 1865) | II |  | | Rosa pendulina, Rosa sp. div. |
| <i>Lampronia capitella</i> (Clerck, 1759) | III |  |  | Ribes nigrum, rubrum |
| <i>Lampronia rupella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | I |  | | |
| <i>Lampronia luzella</i> (Hübner, 1817) | II |  |  | snad Rubus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|-------------------------------|
| <i>Lampronia flavimitrella</i> (Hübner, 1817) | II |  |  | Snad Rubus caesius, R. idaeus |
| <i>Lampronia corticella</i> (Linnaeus, 1758) | III |  |  | Rubus idaeus |
| <i>Lampronia fuscatella</i> (Tengström, 1848) | II |  |  | Betula |
| <i>Tischeria ekebladella</i> (Bjerkander, 1795) | IV |  |  | Quercus sp. div., |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|---------------------------|
| <i>Tischeria dodonaea</i> Stainton, 1858 | III |  |  | Quercus sp. div., |
| <i>Tischeria decidua</i> Wocke, 1876 | III |  7 mm |  6 mm | Quercus sp. div., |
| <i>Coptotriche marginea</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Rubus sp. div. |
| <i>Coptotriche heinemanni</i> Wocke, 1871 | III |  |  | Rubus sp. div., Agrimonia |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|-------------------------|
| <i>Coptotriche gaunacella</i> (Duponchel, 1843) | III | | | Prunus sp. div. |
| <i>Coptotriche angusticollella</i> (Duponchel, 1843) | IV | | | Rosa sp. div. |
| <i>Millieria dolosalis</i> (Heydenreich, 1851) | I | | | Aristolochia clematitis |
| <i>Diplodoma laichartingella</i> (Goeze, 1783) | III | | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|----------|
| <i>Narycia duplicella</i> (Goeze, 1783) | III |  |  | |
| <i>Narycia astrella</i> (Herrich-Schäffer, 1851) | II |  |  | |
| <i>Eosolenobia manni</i> (Zeller, 1852) | III |  |  | |
| <i>Praesolenobia clathrella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1837) | II |  |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|----------|
| <i>Dahlica charlottae</i> (Meier, 1957) | III | | | |
| <i>Dahlica triquetrella</i> (Hübner, 1813) | IV | | | |
| <i>Dahlica lichenella</i> (Linnaeus, 1761) | III | | | |
| <i>Dahlica nickerlii</i> (Heinemann, 1870) | II | | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|----------|
| <i>Dahlica wockii</i> (Heinemann, 1870) | III |  | | |
| <i>Dahlica sauteri</i> (Hättenschwiler, 1977) | I |  |  | |
| <i>Siederia listerella</i> (Linnaeus, 1758) | III |  |  | |
| <i>Taleporia politella</i> (Ochsenheimer, 1816) | II |  |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|----------|
| <i>Taleporia tubulosa</i> (Retzius, 1783) | IV |  |  | |
| <i>Bacotia claustrella</i> (Bruand, 1845) | III |  |  | |
| <i>Proutia betulina</i> (Zeller, 1839) | IV |  |  | |
| <i>Psyche casta</i> (Pallas, 1767) | IV |  |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|----------|
| <i>Psyche crassiorella</i> (Bruand, 1851) | III | | | |
| <i>Bijugis bombycella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II | | | |
| <i>Bijugis pectinella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II | | | |
| <i>Rebelia sapho</i> (Millière, 1868) | II | | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|------------------------|
| <i>Rebelia plumella</i> (Ochsenheimer, 1810) | I |  |  | |
| <i>Rebelia bavarica</i> Wehrli, 1926 | | | | Druhový status nejistý |
| <i>Rebelia kruegeri</i> Turati, 1944 | I |  |  | |
| <i>Psychidea nudella</i> (Ochsenheimer, 1810) | |  |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|----------|
| <i>Acentra subvestalis</i> (Wehrli, 1933) | II |  | | |
| <i>Epichnopterix plumella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |   | | |
| <i>Epichnopterix sieboldii</i> (Reutti, 1853) | I |   |   | |
| <i>Epichnopterix kovaci</i> Sieder, 1955 | I |   | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|----------|
| <i>Whittleia schwingenschussi</i> Rebel, 1910 | II |  11 mm | | |
| <i>Acanthopsyche atra</i> (Linnaeus, 1767) | II |  |  | |
| <i>Canephora hirsuta</i> (Poda, 1761) | IV |  |  | |
| <i>Pachythelia villosella</i> (Ochsenheimer, 1810) | III |  |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|----------|
| <i>Ptilocephala muscella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | |
| <i>Ptilocephala plumifera</i> (Ochsenheimer, 1810) | III |  |  | |
| <i>Megalophanes viciella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |  |  | |
| <i>Megalophanes stetinensis</i> (Hering, 1846) | II |  |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|----------|
| <i>Phalacropterix graslinella</i> (Boisduval, 1852) | II |  |   | |
| <i>Sterrhopterix fusca</i> (Haworth, 1809) | IV |  |  | |
| <i>Sterrhopterix standfussi</i> (Wocke, 1851) | II |  23 mm |  Brno | |
| <i>Apterona helicoidella</i> (Vallot, 1827) | IV |  12 mm |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|---|---------------------------|
| <i>Eumasia parietariella</i> (Heydenreich, 1851) | II |  |  | |
| <i>Ischnoscia borreonella</i> (Milliére, 1874) | ? |  |  | snad lišejníky na skalách |
| <i>Tenaga rhenania</i> (Petersen, 1962) | II |  |  | |
| <i>Matratinea rufulicaput</i> Sziráki et Szöcz, 1990 | ? |  | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|---|---|
| <i>Eudarcia confusella</i> (Heydenreich, 1851) | II |  | | |
| <i>Eudarcia pagenstecherella</i> Hübner, 1825 | II |  |  | řasy na skalách na stinných místech |
| <i>Eudarcia richardsoni</i> (Walsingham, 1900) | ? |  |  | ve skalních stěrbínách ve vlhkém mikroklimatu s porosty řas |
| <i>Eudarcia kasyi</i> (G. Petersen, 1971) | ? |  | | velmi zvláštní místo nálezu - kolejistě železnice |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---|---|---|
| <i>Infurcitinea roesslerella</i> (Heyden, 1865) | II ? |  |  | lišejníky na skalách |
| <i>Infurcitinea argentimaculella</i> (Stainton, 1849) | II |  | | dlouhé chodby v porostech zrnitých lišejníků na stinných místech skal |
| <i>Infurcitinea albicomella</i> (Stainton, 1851) | III |  9 mm |  | |
| <i>Infurcitinea ignicomaella</i> (Heydenreich, 1851) | III |  | | |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|---|---|
| <i>Infurcitinea finalis</i> Gozmany, 1959 | II |  |  |  |
| <i>Lichenotinea pustulatella</i> (Zeller, 1852) | I |  | | v trubkovité chodbičce v porostech lišejníků na zdech |
| <i>Stenoptinea cyaneimarmorella</i> (Millière, 1854) | II |  | | lišejníky na kmenech a shnilé dřevo slivení |
| <i>Agnathosia mendicella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  | | choroše |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|-------------------------------|
| <i>Montescardia tessulatella</i> (Lienig et Zeller, 1846) | IV |  |  | choroše |
| <i>Scardia boletella</i> (Fabricius, 1794) | I |  |  | Fomes fomentarius, staré buky |
| <i>Morophaga choragella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  |  | choroše |
| <i>Triaxomera fulvimitrella</i> (Sodoffsky, 1830) | II |  |  | tlející dřevo, choroše |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Triaxomera parasitella</i> (Hübner, 1796) | III |  |  | tlející dřevo, choroše |
| <i>Archinemapogon yildizae</i> Koçak, 1981 | III |  |  | choroše na listnatých i jehličnatých stromech |
| <i>Nemaxera betulinella</i> (Paykull, 1785) | III |  |  | choroše |
| <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  <p>Germania cent. - Thür. Jena, Ettersburg, 10m 50°46'11.1"N 11°20'41"E 12.06.2022 leg. Egert / Freisch Bild 19469</p> <p>11,5 mm</p> |  | dřevokazné houby, potraviny v domácnostech, obilné sklady |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|--|---|--------------------------------------|
| <i>Nemapogon cloacella</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Daedalea quercina apod. |
| <i>Nemapogon koenigi</i> Čapuše, 1967 (synonymum <i>wolfiella</i> Karsholt & Nielsen, 1976) | II |  |  | snad houby rodu Hypoxylon (dřevomor) |
| <i>Nemapogon inconditella</i> (Lucas, 1956) | II ? |  |  | choroše |
| <i>Nemapogon ruricolella</i> (Stainton, 1849) | III |  | | choroše |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|---|
| <i>Nemapogon variatella</i> (Clemens, 1859) | III |  11 mm |  | |
| <i>Nemapogon gravosaellus</i> Petersen, 1957 | II |  12 mm | | prý <i>Inonotus hispidus</i> - rezavec štětinatý |
| <i>Nemapogon gliriella</i> (Heyden, 1865) | II |  | | prý <i>Stereum hirsutum</i> - pevník chlupatý na olších |
| <i>Nemapogon quercicolella</i> (Zeller, 1852) | II |  | | snad choroše na dubech |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|---|---------------------------------|
| <i>Nemapogon clematella</i> (Fabricius, 1781) | II |  15 mm |  | Hypoxylon - dřevomor |
| <i>Nemapogon fungivorella</i> (Benander, 1939) | II |  | | Daedalea quercina |
| <i>Nemapogon picarella</i> (Clerck, 1759) | II |  Spannweite 14 mm | | choroše na různých listnáčích |
| <i>Nemapogon nigralbella</i> (Zeller, 1839) | II |  | | choroše na buku a tlející dřevo |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|-------------------|
| <i>Nemapogon falstriella</i> (Bang-Haas, 1881) | II |  |  | chroše na stomech |
| <i>Triaxomasia caprimulgella</i> (Stainton, 1851) | II |  |  | |
| <i>Neurothaumasia ankerella</i> (Mann, 1867) | III |  | | tlející dřevo |
| <i>Cephimallota praetoriella</i> (Christoph, 1872) | I ? |  |  | |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|--|--|
| <i>Cephimallota angusticostella</i> (Zeller, 1839) | I ? |  14 mm |  15 mm | |
| <i>Cephimallota crassiflavella</i> (Bruand, 1851) | I ? |  15,5 mm |  14 mm | |
| <i>Reisserita relicinella</i> (Herrich-Schäffer, 1853) | II ? |  14 mm |  11 mm | |
| <i>Trichophaga tapetzella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  18 mm |  | rozličné živočišné materiály - kůže, trus, vývržky sov, kadávery |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|------------------------|
| <i>Trichophaga scandinaviella</i> Zagulajev, 1960 | ? |  |  | dtto |
| <i>Elatobia fuliginosella</i> (Lienig et Zeller, 1846) | I |  | | |
| <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel, 1823) | IV |  |  | synantropně v oblečení |
| <i>Tinea pellionella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  |  | kožešinový a šatní mol |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|----------|
| <i>Tinea translucens</i> Meyrick, 1917 | II |  | | |
| <i>Tinea dubiella</i> Stainton, 1859 | IV |  |  | |
| <i>Tinea pallescentella</i> Stainton, 1851 | IV |  | | |
| <i>Tinea steueri</i> Petersen, 1966 | III |  | 16 mm | |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|----------------------------------|
| <i>Tinea omichlopis</i> (Meyrick, 1928) | III |  13 mm |  | ptačí hnízda, trus netopýrů |
| <i>Tinea columbariella</i> Wocke, 1877 | IV |  |  | ptačí hnízda, holubníky, kurníky |
| <i>Tinea semifulvella</i> Haworth, 1828 | IV |  | | ptačí hnízda atd. |
| <i>Tinea trinotella</i> Thunberg, 1794 | IV |  | | ptačí hnízda |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|------------------------|--|
| <i>Niditinea fuscella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  13,5 mm | | ptačí hnízda |
| <i>Niditinea striolella</i> (Matsumura, 1931) | III |  13 mm | | ptačí hnízda |
| <i>Niditinea truncicolella</i> (Tengström, 1847) | I |  13 mm | | mravenčí hnízda |
| <i>Monopis laevigella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  17,5 mm | | ptačí hnízda a různé organické materiály |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-------|---|--|---|
| <i>Monopis neglecta</i> Šumpich et Liška, 2011 | III ? |  | | dtto |
| <i>Monopis weaverella</i> (Scott, 1858) | IV |  | | dtto |
| <i>Monopis obviella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  | zadní okraj předních křídel zlatě žlutý | ptačí hnízda |
| <i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859) | II |  |  | zadní okraj předních křídel krémový až světle hnědý, ptačí hnízda, trus, peří, výkaly netopýrů atd. |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---------|------------------------|--|
| <i>Monopis imella</i> (Hübner, 1813) | IV | | | živočišný materiál |
| <i>Monopis monachella</i> (Hübner, 1796) | III | | | ptačí hnízda, živočišné materiály - srst |
| <i>Monopis fenestratella</i> (Heyden, 1863) | II | | | ptačí hnízda, živočišné materiály |
| <i>Ateliotum hungaricellum</i> Zeller, 1839 | II ? | | | |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|---|
| <i>Haplotinea insectella</i> (Fabricius, 1794) | IV | | | rozličný rostlinný a živočišný materiál |
| <i>Haplotinea ditella</i> Pierce et Diakonoff, 1958 | III | | | |
| <i>Opogona sacchari</i> (Bojer, 1856) | IV | | | |
| <i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828) | I ? | | | naprostý polyfág |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|---|---|
| <i>Euplocamus anthracinalis</i> (Scopoli, 1763) | II |  |   | Fagus, Quercus, Crataegus - teplomilné doubravy - tlející dřevo, dřevokazné houby |
| <i>Psychoides verhuella</i> Bruand, 1853 | II |  |   | Asplenium sp. div. |
| <i>Pelecystola fraudulentella</i> (Zeller, 1852) | ? |  | | jediný historický údaj ze severních Čech z roku 1932 |
| <i>Roeslerstammia erxlebella</i> (Fabricius, 1787) | IV |  |   | Tilia |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|--|
| <i>Roeslerstammia pronubella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Carpinus betulus |
| <i>Bucculatrix cristatella</i> (Zeller, 1839) | III |  |  | Achillea millefolium, Anthemis tinctoria |
| <i>Bucculatrix nigricomella</i> (Zeller, 1839) | II |  |  | Leucanthemum |
| <i>Bucculatrix argentisignella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I |  | | Leucanthemum vulgare |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|--|
| <i>Bucculatrix humiliella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | III |  |  | Tanacetum vulgare, Achillea millefolium? |
| <i>Bucculatrix gnaphaliella</i> (Treitschke, 1833) | I |  |  | Helichrysum arenarium |
| <i>Bucculatrix absinthii</i> Gartner, 1865 | I |  | | Artemisia absinthium |
| <i>Bucculatrix artemisiella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I |  |  | Artemisia campestris |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|----------------------|
| <i>Bucculatrix ratisbonensis</i> Stainton, 1861 | II |  | | Artemisia campestris |
| <i>Bucculatrix noltei</i> Petry, 1912 | III |  |  | Artemisia vulgaris |
| <i>Bucculatrix maritima</i> (Stainton, 1851) | I |  9 mm |  | Aster tripolium |
| <i>Bucculatrix albedinella</i> (Zeller, 1839) | II |  |  | Ulmus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|------------------|
| <i>Bucculatrix demaryella</i> (Duponchel, 1840) | III |  |  | Tilia, Betula |
| <i>Bucculatrix bechsteinella</i> (Scharfenberg, 1805) | IV |  |  | Crataegus, Pyrus |
| <i>Bucculatrix ulmella</i> Zeller, 1848 | III |  7 mm |  | Quercus |
| <i>Bucculatrix ulmifoliae</i> (Hering, 1930) | III |  |  | Ulmus |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|-------------------------------------|
| <i>Bucculatrix cidarella</i> (Zeller, 1839) | II |  |  | Alnus |
| <i>Bucculatrix thoracella</i> (Thunberg, 1794) | IV |  |  | Tilia, Acer, Aesculus... |
| <i>Bucculatrix frangutella</i> (Goeze, 1783) | IV |  |  | Frangula alnus, Cornus sanguinea |
| <i>Caloptilia cuculipennella</i> (Hübner, 1796) | IV |  |  | Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|------------------------|
| <i>Caloptilia populetorum</i> (Zeller, 1839) | III |  |  | Betula |
| <i>Caloptilia rosipennella</i> (Hübner, 1796) | IV |  |  | <i>Juglans regia</i> |
| <i>Caloptilia falconipennella</i> (Hübner, 1813) | II |  13 mm |  14 mm | <i>Alnus glutinosa</i> |
| <i>Caloptilia stigmatella</i> (Fabricius, 1781) | IV |  |  | <i>Salix</i> sp. div. |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---|
| <i>Caloptilia rufipennella</i> (Hübner, 1796) | III |  13 mm |  | Acer sp. div. |
| <i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913) | IV |  12 mm |  | Rhododendron sp. div. ve sklenících |
| <i>Caloptilia elongella</i> (Linnaeus, 1761) | IV |  |  | Alnus, Betula |
| <i>Caloptilia hemidactylella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|----------------------------|
| <i>Caloptilia betulicola</i> (Hering, 1928) | III |  |  | Betula |
| <i>Caloptilia alchimiella</i> (Scopoli, 1763) | IV |  13,5 mm |  | Quercus, (Fagus, Castanea) |
| <i>Caloptilia robustella</i> Jäckh, 1972 | III |  10,5 mm |  | Quercus, (Fagus, Castanea) |
| <i>Caloptilia fidella</i> (Reutti, 1853) | II |  12 mm |  | Humulus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|---------------------|
| <i>Caloptilia honoratella</i> (Rebel, 1914) | II |  12,5 mm | | Acer pseudoplatanus |
| <i>Caloptilia semifascia</i> (Haworth, 1828) | III |  11,5 mm |  | Acer campestre |
| <i>Caloptilia jurateae</i> Bengtsson, 2010 | I |  |  | Acer platanoides |
| <i>Caloptilia fribergensis</i> (Fritsche, 1871) | II |  11 mm |  | Acer pseudoplatanus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|--|-----------------------------------|
| <i>Caloptilia hauderi</i> (Rebel, 1906) | I |  | | Acer pseudoplatanus, A. campestre |
| <i>Caloptilia loriolella</i> (Frey, 1881) | II |  |  | Fraxinus excelsior |
| <i>Caloptilia syringella</i> (Fabricius, 1794) | IV |  |  | Ligustrum, Syringa, Fraxinus |
| <i>Povolnya leucapennella</i> (Stephens, 1835) | II ? |  |  | Quercus, Castanea |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|--|
| <i>Micrurapteryx kollariella</i> (Zeller, 1839) | III | | | Chamaecytisus, Cytisus, Genista, Laburnum |
| <i>Euspilapteryx auroguttella</i> (Stephens, 1835) | IV | | | Hypericum |
| <i>Calybites quadrisignella</i> (Zeller, 1839) | I | | | |
| <i>Calybites phasianipennella</i> (Hübner, 1813) | IV | | | hnědý konec tykadla Rhamnus, Frangula, bílý konec tykadla |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|--|
| <i>Aristaea pavoniella</i> (Zeller, 1847) | I |  9 mm | | Aster amellus, A. alpinus |
| <i>Aspilapteryx tringipennella</i> (Zeller, 1839) | II |  12 mm |  | Plantago lanceolata, P. media |
| <i>Aspilapteryx limosella</i> (Duponchel, 1843) | I |  9 mm |  | Teucryum chamaedrys |
| <i>Sauterina hofmanniella</i> (Schleich, 1867) | I |  12 mm |  | Lathyrus niger, L. vernus, housenky končí v červenci |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|---|
| <i>Acrocercops brongniardella</i> (Fabricius, 1798) | III |  10 mm |  | Quercus |
| <i>Dialectica imperialella</i> (Mann, 1847) | II |  9 mm |  | Symphytum, Pulmonaria, Lithospermum - puchářnatá mina na svrchní straně listu |
| <i>Leucospilapteryx omissella</i> (Stainton, 1848) | III |  |  | Artemisia vulgaris |
| <i>Parectopa ononidis</i> (Zeller, 1839) | II |  |  | Ononis spinosa |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|--|
| <i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863 | IV |  |  | Robinia |
| <i>Ornixola caudulatella</i> (Zeller, 1839) | II |  | | <i>Salix viminalis, S. triandra</i> |
| <i>Callisto denticulella</i> (Thunberg, 1794) | IV |  |  | Malus |
| <i>Callisto insperatella</i> (Nickerl, 1864) | I ? |  | | <i>Prunus padus</i> (<i>P. cerasus</i> , <i>P. cerasifera</i>) |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|------------------|
| <i>Parornix fagivora</i> (Frey, 1861) | II |  |  | Fagus |
| <i>Parornix scoticella</i> (Stainton, 1850) | III |  10 mm |  | Sorbus |
| <i>Parornix devoniella</i> (Stainton, 1850) | III |  |  | Corylus |
| <i>Parornix carpinella</i> (Frey, 1861) | III |  |  | Carpinus betulus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|-----------------------------------|
| <i>Parornix betulae</i> (Stainton, 1854) | IV |  10 mm |  | Betula |
| <i>Parornix anglicella</i> (Stainton, 1850) | IV |  10 mm |  | Crataegus, Pyrus |
| <i>Parornix tenella</i> (Rebel, 1919) | I |  8 mm  |  | Amygdalus nana, Corylus avellana? |
| <i>Parornix szocsi</i> Gozmany, 1952 | I |  | | Prunus fruticosa |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|------------------------------|
| <i>Parornix petiolella</i> (Frey, 1861) | IV |  9 mm |  | Malus |
| <i>Parornix finitimella</i> (Zeller, 1850) | IV |  |  | Prunus |
| <i>Parornix torquillella</i> (Zeller, 1850) | IV |  10,5 mm |  | Prunus |
| <i>Parornix anguliferella</i> (Zeller, 1847) | III |  10 mm <small>Austria or. Wien 16.8.1922 N. 16229 E Pyrus pyrasfor Herrenbach Pyrus pyrasfor 24. sep. 29.VI.2014</small> | | Prunus, Pyrus, Sorbus, Malus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|--------------------------------|
| <i>Cameraria ohridella</i> Deschka et Dimić, 1986 | IV |  9 mm |  | <i>Aesculus hippocastanum</i> |
| <i>Macrosaccus robiniella</i> (Clemens, 1859) | IV |  5 mm |  | <i>Ribinia</i> |
| <i>Triberta helianthemella</i> (Herrich-Schäffer, 1861) | I |  |  | <i>Helianthemum nummularia</i> |
| <i>Phyllonorycter maestingella</i> (Müller, 1764) | III |  9 mm |  | <i>Fagus</i> |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|-------------------|
| <i>Phyllonorycter lautella</i> (Zeller, 1846) | III |  |  | Quercus semenáčky |
| <i>Phyllonorycter heegeriella</i> (Zeller, 1846) | III |  |  | Quercus |
| <i>Phyllonorycter muelleriella</i> (Zeller, 1839) | III |  | | Quercus |
| <i>Phyllonorycter cerasicolella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | IV |  |  | Prunus sp. div. |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|-------------------|
| <i>Phyllonorycter spinicolella</i> (Zeller, 1846) | IV |  7 mm |  | Prunus spinosa |
| <i>Phyllonorycter scitulella</i> (Duponchel, 1843) | I |  |  | Quercus pubescens |
| <i>Phyllonorycter parisiella</i> (Wocke, 1848) | I |  8 mm | | Quercus pubescens |
| <i>Phyllonorycter quercifoliella</i> (Zeller, 1839) | IV |  8 mm |  | Quercus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|--------------------------------------|
| <i>Phyllonorycter cerris</i> (Gregor, 1952) | I | | | Quercus cerris |
| <i>Phyllonorycter ilicifoliella</i> (Duponchel, 1843) | I | | | Quercus petraea, Q. robur, Q. cerris |
| <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> (Hübner, 1796) | IV |  |  | ovocné, Betula |
| <i>Phyllonorycter kuhlweiniella</i> (Zeller, 1839) | II |  | | Quercus pubescens |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|------------------|
| <i>Phyllonorycter leucographella</i> (Zeller, 1850) | IV |  8mm |  | Pyracantha |
| <i>Phyllonorycter klemannella</i> (Fabricius, 1781) | III |  8 mm |  | Alnus |
| <i>Phyllonorycter tenerella</i> (Joannis, 1915) | III |  7 mm |  | Carpinus, spodní |
| <i>Phyllonorycter coryli</i> (Nickerl, 1851) | III |  6 mm |  | Corylus, svrchní |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|-----------------------------|
| <i>Phyllonorycter esperella</i> (Goeze, 1783) | III |  8 mm |  | Carpinus, svrchní na okraji |
| <i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870) | IV |  9 mm |  | Platanus |
| <i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963) | IV |  |  | Tilia |
| <i>Phyllonorycter mespilella</i> (Hübner, 1805) | II |  7 mm | | Maloidea, snad i Prunoidea? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|------------------------|
| <i>Phyllonorycter cydoniella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |  | | Sorbus torminalis atd. |
| <i>Phyllonorycter oxyacanthalae</i> (Frey, 1856) | IV |  7 mm |  | Crataegus, Pyrus |
| <i>Phyllonorycter sorbi</i> (Frey, 1855) | III |  8 mm |  | Sorbus aucuparia |
| <i>Phyllonorycter blancardella</i> (Fabricius, 1781) | IV |  8 mm |  | Malus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|----------------|
| <i>Phyllonorycter hostis</i> Triberti, 2007 | III | | | Malus, Pyrus |
| <i>Phyllonorycter gerasimowi</i> Hering, 1930 | I | | | Malus |
| <i>Phyllonorycter junoniella</i> (Zeller, 1846) | I |  8 mm |  | Vaccinium v.i. |
| <i>Phyllonorycter roboris</i> (Zeller, 1839) | IV |  9 mm |  | Quercus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|--------------------------------|
| <i>Phyllonorycter abrasella</i> (Duponchel, 1843) | I |  10 mm | | Quercus pubescens |
| <i>Phyllonorycter distentella</i> (Zeller, 1846) | I |  9 mm |  | Quercus pubescens |
| <i>Phyllonorycter mannii</i> (Zeller, 1846) | I |  8 mm | | Quercus pubescens, Q. sp. div. |
| <i>Phyllonorycter strigulatella</i> (Lienig et Zeller, 1846) | III |  9 mm |  | Alnus incana |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|-----------------|
| <i>Phyllonorycter cavella</i> (Zeller, 1846) | III |  10 mm |  | Betula |
| <i>Phyllonorycter froelichiella</i> (Zeller, 1839) | III |  9 mm |  | Alnus |
| <i>Phyllonorycter nicellii</i> (Stainton, 1851) | III |  7 mm |  | Corylus, spodní |
| <i>Phyllonorycter stettinensis</i> (Nickerl, 1852) | III |  7 mm |  | Alnus, svrchní |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|------------------|
| <i>Phyllonorycter alpinus</i> (Frey, 1856) | I |  |  | Alnus viridis |
| <i>Phyllonorycter rajella</i> (Linnaeus, 1758) | III |  |  | Alnus |
| <i>Phyllonorycter ulmifoliella</i> (Hübner, 1817) | IV |  |  | Betula |
| <i>Phyllonorycter andriidae</i> (Fletcher, 1885) | I |  |  | Betula semenacki |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|----------------------------|
| <i>Phyllonorycter acerifoliella</i> (Zeller, 1839) | III |  7 mm |  | <i>Acer campestris</i> |
| <i>Phyllonorycter joannisi</i> (Le Marchant, 1936) | III |  7 mm |  | <i>Acer platanoides</i> |
| <i>Phyllonorycter geniculella</i> (Ragonot, 1874) | III |  8 mm |  | <i>Acer pseudoplatanus</i> |
| <i>Phyllonorycter dubitella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | IV |  8 mm |  | <i>Salix caprea</i> |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|--------------------------------|
| <i>Phyllonorycter salicella</i> (Zeller, 1846) | III |  7 mm |  | Salix purpurea atd. |
| <i>Phyllonorycter vimenorum</i> (Stainton, 1854) | I |  | | Salix viminalis |
| <i>Phyllonorycter hilarella</i> (Zetterstedt, 1839) | III |  10 mm |  | Salix caprea, velkoplošná mina |
| <i>Phyllonorycter salicicolella</i> (Sircom, 1848) | IV |  8 mm |  | Salix širolisté |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|--|---|----------------------------------|
| <i>Phyllonorycter medicaginella</i> (Gerasimov, 1930) | IV |  |  | Medicago, Melilotus |
| <i>Phyllonorycter trifoliella</i> (Gerasimov, 1933) | II ? |  6 mm | | Lathyrus pratensis, Trifolium |
| <i>Phyllonorycter insignitella</i> (Zeller, 1846) | III |  8 mm |  | Trifolium medium, T. alpestre... |
| <i>Phyllonorycter scopariella</i> (Zeller, 1846) | I |  | | Cytisus scoparius |




| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Phyllonorycter fraxinella</i> (Zeller, 1846) | II |  | | Genista germanica, G. tinctoria |
| <i>Phyllonorycter staintoniella</i> (Nicelli, 1853) | |  | | Genista, Chamaecytisus |
| <i>Phyllonorycter eugregori</i> (Laštůvka et Laštůvka, 2006) | I | | | Chamaecytisus ratisbonensis, Ch. austriacus |
| <i>Phyllonorycter nigrescentella</i> (Logan, 1851) | |  |  | Lathyrus vernus |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|---|
| <i>Phyllonorycter harrisella</i> (Linnaeus, 1761) | IV |  7 mm |  | Quercus sp. div. |
| <i>Phyllonorycter delitella</i> (Duponchel, 1843) | I |  7 mm | | Quercus pubescens |
| <i>Phyllonorycter populifoliella</i> (Treitschke, 1833) | IV |  8 mm |  | Populus |
| <i>Phyllonorycter pastorella</i> (Zeller, 1846) | III |  |  | Salix alba, S. sepulcralis, S. babylonica |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|-----------------|
| <i>Phyllonorycter sagitella</i> (Bjerkander, 1790) | IV |  7 mm |  | Populus tremula |
| <i>Phyllonorycter comparella</i> (Duponchel, 1843) | |  7 mm |  | Populus alba |
| <i>Phyllonorycter apparella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II |  | | Populus tremula |
| <i>Phyllonorycter connexella</i> (Zeller, 1846) | |  10 mm |  | Salix, Populus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|---|
| <i>Phyllonorycter quinquegutella</i> (Stainton, 1851) | I |  |  | Salix repens |
| <i>Phyllonorycter schreberella</i> (Fabricius, 1781) | III |  6 mm |  | Ulmus minor |
| <i>Phyllonorycter scabiosella</i> (Douglas, 1853) | I |  9,5 mm |  | Scabiosa columbaria, S. ochroleuca, housenka červenec až jaro spodní mina na přízemních listech, dvě generace |
| <i>Phyllonorycter agilella</i> (Zeller, 1846) | III |  |  | Ulmus minor |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|-----------------------------|
| <i>Phyllonorycter emberizaepennella</i> (Bouché, 1834) | IV |  8 mm |  | Lonicera, Symphoricarpos |
| <i>Phyllonorycter lantanella</i> (Schrank, 1802) | II |  7 mm |  | Viburnum lantana, V. opulus |
| <i>Phyllonorycter tristrigella</i> (Haworth, 1828) | III |  8mm |  | Ulmus |
| <i>Phyllonorycter acaciella</i> (Duponchel, 1843) | I |  |  | Ulmus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|--|
| <i>Phyllocnistis saligna</i> (Zeller, 1839) | IV |  |  | |
| <i>Phyllocnistis valentinensis</i> Hering, 1936 | III |  |  | |
| <i>Phyllocnistis ramulicola</i> Langmaid et Corley, 2007 | II |  |  Salix alba? | |
| <i>Phyllocnistis asiatica</i> Martynova, 1955 | III |  |  |  |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|---|
| <i>Phyllocnistis labyrinthella</i> (Bjerkander, 1790) | III |  |  | Populus tremula |
| <i>Phyllocnistis xenia</i> Hering, 1939 | III |  |  | Populus alba |
| <i>Phyllocnistis unipunctella</i> (Stephens, 1834) | IV |  |  |  |
| <i>Phyllocnistis extrematrix</i> Martynova, 1955 | IV |  |  | Populus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Scythropia crataegella</i> (Linnaeus, 1767) | IV |  13 mm |  | Crataegus, Cotoneaster, Malus, Pyrus |
| <i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  25 mm |  | Prunus padus, (Sorbus aucuparia) |
| <i>Yponomeuta padella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  22 mm |  20,5 mm |  Prunus spinosa |
| <i>Yponomeuta malinellus</i> Zeller, 1838 | IV |  21 mm |  | Malus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|----------------------|
| <i>Yponomeuta cagnagella</i> (Hübner, 1813) | IV |  25 mm |  | Euonymus |
| <i>Yponomeuta irrorella</i> (Hübner, 1796) | II |  27 mm |  | Euonymus, jednotlivě |
| <i>Yponomeuta rorella</i> (Hübner, 1796) | I |  23 mm |  | Salix fragilis |
| <i>Yponomeuta plumbella</i> (Denis et Schiffmüller, 1775) | III |  |  | Euonymus |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|--|--------------------------------|
| <i>Yponomeuta sedella</i> Treitschke, 1832 | II |  17 mm |  | Sedum |
| <i>Euhypomeuta stannella</i> (Thunberg, 1794) | I |  | | Sedum maximum v dubnu - květnu |
| <i>Zelleria hepariella</i> Stainton, 1849 | II |  15 mm |  | Fraxinus |
| <i>Kessleria alpicella</i> (Stainton, 1851) | I |  |  | Saxifraga paniculata |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|---|
| <i>Pseudoswammerdamia combinella</i> (Hübner, 1786) | II | | | Prunus spinosa na stinných místech |
| <i>Swammerdamia caesiella</i> (Hübner, 1796) | III | | | Betula - bílá hlava, šedé teguly |
| <i>Swammerdamia pyrella</i> (de Villers, 1789) | IV | | | Malus, Pyrus, Crataegus...bílá hlava, tmavě šedé teguly, měděná lesk třásní v apexu i prilehlé části křídla |
| <i>Swammerdamia compunctella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | III | | | Sorbus aucuparia, bílá hlava, světle hnědé teguly |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|--|
| <i>Paraswammerdamia albicapitella</i> (Scharfenberg, 1805) | I | | | Prunus, Crataegus, bílá hlava, bílé teguly |
| <i>Paraswammerdamia nebulella</i> (Goeze, 1783) | II | | | Sorbus, nažloutlá hlava, šedé teguly |
| <i>Cedestis gyseleniella</i> Zeller, 1839 | III | | | Pinus sylvestris |
| <i>Cedestis subfasciella</i> (Stephens, 1834) | II | | | Pinus sylvestris |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|------------------------|
| <i>Ocnerostoma piniariella</i> Zeller, 1847 | III |  | | Pinus sylvestris |
| <i>Ocnerostoma friesei</i> Svensson, 1966 | III |  |  | Pinus sylvestris |
| <i>Niphonympha dealbatella</i> (Zeller, 1847) | I |  | | |
| <i>Argyresthia laevigatellus</i> (Heydenreich, 1851) | III |  | | Larix koncové větvičky |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|-------------------|
| <i>Argyresthia illuminatella</i> Zeller, 1839 | II |  | | Larix |
| <i>Argyresthia kulfani</i> Bengtsson et Johansson, 2002 | I ? |  | | <i>Abies alba</i> |
| <i>Argyresthia glabratella</i> (Zeller, 1847) | III |  |  | Picea boční pupen |
| <i>Argyresthia amiantella</i> (Zeller, 1847) | I |  | | Picea abies |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|--|------------------------|
| <i>Argyresthia Svenssoni</i> Bengtsson et Johansson, 2012 | I |  | | Picea |
| <i>Argyresthia bergiella</i> (Ratzeburg, 1840) | II |  |  | Picea terminální pupen |
| <i>Argyresthia praecocella</i> Zeller, 1839 | I |  | | Juniperus communis |
| <i>Argyresthia arceuthina</i> Zeller, 1839 | I |  |  | Juniperus communis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|--------------------|
| <i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871 | IV |  | | Juniperus cult. |
| <i>Argyresthia reticulata</i> Staudinger, 1877 | I |  |  | Juniperus |
| <i>Argyresthia thuiella</i> (Packard, 1871) | IV |  |  | Thuia |
| <i>Argyresthia dilectella</i> Zeller, 1847 | I |  | | Juniperus communis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|-------------------------------------|
| <i>Argyresthia abdominalis</i> Zeller, 1839 | I |  |  | Juniperus communis |
| <i>Argyresthia aurulentella</i> Stainton, 1849 | I |  | | Juniperus communis |
| <i>Argyresthia brockeella</i> (Hübner, 1813) | IV |  | | Alnus, Betula - jehnědy, pod borkou |
| <i>Argyresthia ivella</i> (Haworth, 1828) | III |  | | Carpinus, Corylus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|---------------------|
| <i>Argyresthia goedartella</i> (Linnaeus, 1758) | IV | | | Betula, Alnus |
| <i>Argyresthia pygmaeella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III | | | Salix |
| <i>Argyresthia sorbiella</i> (Treitschke, 1833) | III | | | Sorbus, Cotoneaster |
| <i>Argyresthia curvella</i> (Linnaeus, 1761) | IV | | | Malus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|-------------------------------|
| <i>Argyresthia retinella</i> Zeller, 1839 | IV |  | | Betula |
| <i>Argyresthia fundella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1835) | I |  |  | Picea abies |
| <i>Argyresthia glaucinella</i> Zeller, 1839 | II |  | | Quercus - borka letitých dubů |
| <i>Argyresthia spinosella</i> Stainton, 1849 | III |  |  | Prunus spinosa |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|------------------------|---|
| <i>Argyresthia conjugella</i> Zeller, 1839 | IV |  | | Sorbus, Crataegus, Malus, Prunus |
| <i>Argyresthia pulchella</i> Lienig et Zeller, 1846 | II |  | | Sorbus, Malus |
| <i>Argyresthia semifusca</i> (Haworth, 1828) | III |  | | Sorbus, Crataegus, Prunus padus, Prunus spinosa |
| <i>Argyresthia pruniella</i> (Clerck, 1759) | IV |  | | Prunus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|-----------------------|
| <i>Argyresthia bonnetella</i> (Linnaeus, 1758) | III | | | Crataegus, Prunus |
| <i>Argyresthia albistria</i> (Haworth, 1828) | II | | | Prunus spinosa |
| <i>Argyresthia semitestacea</i> (Curtis, 1833) | I | | | Fagus - ve větvičkách |
| <i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758) | IV | | | Brassicaceae |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|------------------------|---|
| <i>Plutella porrectella</i> (Linnaeus, 1758) | II |  15,5 mm | | Hesperis, Cheiranthus, asi i jiné Brassicaceae (Cardamine pratensis, amara) |
| <i>Rhigognostis senilella</i> (Zetterstedt, 1839) | II |  | | Cardamine pratensis, Arabidopsis petraea, |
| <i>Rhigognostis annulatella</i> (Curtis, 1832) | II |  | | Cardamine hirsuta, Arabidopsis petraea, Brassica, Descurainia sophia |
| <i>Rhigognostis schmaltzella</i> (Zetterstedt, 1839) | ? |  | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|------------------------------------|
| <i>Rhigognostis incarnatella</i> (Steudel, 1873) | II |  Spannweite 19 mm | | Alliaria, Sisymbrium..., |
| <i>Rhigognostis hufnagelii</i> (Zeller, 1839) | II |  | | Arabis hirsuta, A. glabra |
| <i>Eidophasia messangiella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1840) | III |  | | Cardamine, Lunaria, Cardaria draba |
| <i>Orthotaelia sparganella</i> (Thunberg, 1788) | III |  21 mm |  | Sparganium erctum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|--|-----------------------|
| <i>Digitivalva arnicella</i> (Heyden, 1863) | I |  |  | Arnica montana |
| <i>Digitivalva reticulella</i> (Hübner, 1796) | I |  | | Gnaphalium sylvaticum |
| <i>Digitivalva perlepidella</i> (Stainton, 1849) | I |  | | Inula conyza |
| <i>Digitivalva pulicariae</i> (Klimesch, 1956) | I |  |  | Pulicaria dysenterica |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|------------------------|--|
| <i>Digitivalva valeriella</i> (Snellen, 1878) | I ? |  | | Inula britannica - listové miny |
| <i>Digitivalva granitella</i> (Treitschke, 1833) | I |   | | Inula conyza |
| <i>Acrolepiopsis assectella</i> (Zeller, 1839) | II |   | 13,5 mm | Allium |
| <i>Acrolepiopsis betulella</i> (Curtis, 1850) | I |  | | Allium ursinum - tobolky, konec května - poč. června |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|--------------------------------------|
| <i>Acrolepia autumnitella</i> Curtis, 1838 | II |  |  | Solanum dulcamara, Atropa bella-dona |
| <i>Glyptipterix thrasonella</i> (Scopoli, 1763) | I |  | | Juncus |
| <i>Glyptipterix bergstraesserella</i> (Fabricius, 1781) | I |  | | Luzula sylvatica, L. luzuloides |
| <i>Glyptipterix equitella</i> (Scopoli, 1763) | II |  | | Sedum album... |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|--------------------------------------|
| <i>Glyptipterix haworthana</i> (Stephens, 1834) | I |  12 mm | | Eriophorum |
| <i>Glyptipterix forsterella</i> (Fabricius, 1781) | II |  9 mm | | Carex remota |
| <i>Glyptipterix simpliciella</i> (Stephens, 1834) | IV |  7 mm | | Dactylis glomerata |
| <i>Glyptipterix schoenicolella</i> Boyd, 1859 | II |  7 mm |  | Schoenus nigricans, Cladium mariscus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|----------|
| <i>Ypsolopha mucronella</i> (Scopoli, 1763) | III |  |  | Euonymus |
| <i>Ypsolopha nemorella</i> (Linnaeus, 1758) | II |  |  | Lonicera |
| <i>Ypsolopha dentella</i> (Fabricius, 1775) | III |  |  | Lonicera |
| <i>Ypsolopha falcella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |  |  | Lonicera |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|--------------------------------------|
| <i>Ypsolopha asperella</i> (Linnaeus, 1761) | III |  |  | Prunus, Pyrus, Cotoneaster |
| <i>Ypsolopha scabrella</i> (Linnaeus, 1761) | IV |  |  | Malus, Pyrus, Crataegus, Cotoneaster |
| <i>Ypsolopha horridella</i> (Treitschke, 1835) | III |  |  | ovocné stromy a keře |
| <i>Ypsolopha lucella</i> (Fabricius, 1775) | II |  |  | Quercus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|-----------------------------------|
| <i>Ypsolopha persicella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Prunus dulcis, P. persica |
| <i>Ypsolopha alpella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  | | Quercus |
| <i>Ypsolopha sylvestra</i> (Linnaeus, 1767) | III |  |  | Quercus, Betula, Populus tremula |
| <i>Ypsolopha parenthesella</i> (Linnaeus, 1761) | IV |  |  | Fagus, Carpinus, Quercus, Corylus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|--|
| <i>Ypsolopha ustella</i> (Clerck, 1759) | III |  |  | Quercus, Populus tremula, Fraxinus, Corylus... |
| <i>Ypsolopha sequella</i> (Clerck, 1759) | III |  |  | Acer pseudoplatanus |
| <i>Ypsolopha vittella</i> (Linnaeus, 1758) | II |  |  | Ulmus |
| <i>Ypsolopha coriacella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) | I |  | | Abies alba? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|------------------------|----------------|
| <i>Ypsolopha chazariella</i> (Mann, 1866) | I |  | | Acer tataricum |
| <i>Ochsenheimeria taurella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |   | 11,5 mm | Gramineae |
| <i>Ochsenheimeria urella</i> Fischer von Röslerstamm, 1842 | II |   | Spannweite 13 mm | Gramineae |
| <i>Ochsenheimeria vacculella</i> Fischer von Röslerstamm, 1842 | III |   | | Gramineae |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Atemelia torquatella</i> (Lienig et Zeller, 1846) | III |  |  | Betula, Ulmus |
| <i>Prays fraxinella</i> (Bjerkander, 1784) | IV |  |  | Fraxinus, hlava šedobílá |
| <i>Prays ruficeps</i> (Heinemann, 1854) | IV |  |  | Fraxinus, hlava oranžová |
| <i>Heliodines roesella</i> (Linnaeus, 1758) | II |  |  | Chenopodium bonus-henricus, Chenopodiaceae |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|---------------------------------------|
| <i>Bedellia somnulentella</i> (Zeller, 1847) | IV | | | Convolvulus, Calystegia |
| <i>Bedellia ehikella</i> Szöcz, 1967 | I ? | | | Convolvulus cantabrica |
| <i>Leucoptera sinuella</i> (Reutti, 1853) | III | | | Populus - hromadně v listových minách |
| <i>Leucoptera laburnella</i> (Stainton, 1851) | II | | | Genista, Cytisus, Laburnum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|--|
| <i>Leucoptera spartifoliella</i> (Hübner, 1813) | IV |  |  | Sartothamnus scoparius |
| <i>Leucoptera heringiella</i> Toll, 1938 | II |  | | Cytisus nigricans |
| <i>Leucoptera lotella</i> (Stainton, 1858) | II |  | | Tetragonolobus maritimus, Lotus corniculatus, L. uliginosus, Securigera varia, |
| <i>Leucoptera onobrychidella</i> Klimesch, 1937 | I |  | | Onobrychis |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---------------------|
| <i>Leucoptera lustratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) | II |  |  | Hypericum |
| <i>Leucoptera malifoliella</i> (Costa, 1836) | IV |  |  | Maloidea, Betula |
| <i>Leucoptera aceris</i> (Fuchs, 1903) | I |  | | Acer campestre |
| <i>Lyonetia prunifoliella</i> (Hübner, 1796) | III |  |  | Prunus, Cotoneaster |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|------------------|
| <i>Lyonetia clerkella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  |  | Rosaceae, Betula |
| <i>Lyonetia ledi</i> Wocke, 1859 | I |  |  | Ledum palustre |
| <i>Lyonetia pulverulentella</i> Zeller, 1839 | II |  | | Salix sp. div. |
| <i>Phyllobrostis hartmanni</i> Staudinger, 1867 | I |  |  | Daphne cneorum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|--|-----------------------------|
| <i>Tinagma signatum</i> Gaedike, 1991 | II ? |  9 mm | | Geum montanum? |
| <i>Tinagma perdicella</i> Zeller, 1839 | III |  10,5 mm | | Fragaria, Rubus, Potentilla |
| <i>Tinagma ocnerostomella</i> (Stainton, 1850) | III |  10,5 mm | | Echium vulgare |
| <i>Tinagma balteolella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1841) | II |  9 mm |  8,5 mm | Echium vulgare |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-------|---|--|--|
| <i>Klimeschia transversella</i> (Zeller, 1839) | III |  Spannweite 6,5 mm |  | Thymus, Potentilla, Helichrysum |
| <i>Oegoconia uralskella</i> Popescu-Gorj et Capuse, 1965 | III ? |  15,5 mm | | makadla s tmavým kroužkem oproti O. caradjai |
| <i>Oegoconia deauratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) | II ? |  11,5 mm |  | |
| <i>Oegoconia caradjai</i> Popescu Gorj et Capuse, 1965 | III |  |  | makadla celá žlutá oproti O. uralskella, případně šedohnědá, tak i hlava |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-------|--|------------------------|--|
| <i>Oegoconia novimundi</i> (Busck, 1915) | III ? | | | přiléta na feromon pro <i>Cydia funebrana</i> |
| <i>Apatema whalleyi</i> Popescu-Gorj et Capuse, 1965 | ? | 10 mm | | |
| <i>Lecithocera nigrana</i> (Duponchel, 1836) | II | 12,5 mm | | detrit? |
| <i>Blastobasis phycidella</i> (Zeller, 1839) | III | 15,5 mm <small>Gernika cent. - Thür. Area Berggrabenweg 162m 50°59'11"N 11°30'0"E 23.8.2020 lux les. Egert Freisch Bild 17696</small> | | první článek tykadel samců s výrůstkem pokrytým krátkými rezavými šupinkami nepřesahujícími výrůstek, který je tak oble zakončen, čelo a první makadlový článek více či méně žluté |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---|---|---|
| <i>Blastobasis glandulella</i> (Riley, 1871) | IV |  <small>Gernania cent. - Thür. Jena Bergfelsen 180m 07°56'N 12°45'E 15.6.2020 leg. Egert Friedrich Bild 17696</small> 19 mm | | první článek tykadel samců s výrůstkom pokrytým dlouhými kropenatými šupinkami, přesahujícími výrůstek, který je tak zašpičatělý, čelo se šedými a světle hnědými šupinkami |
| <i>Blastobasis pannonica</i> Šumpich et Liška, 2011 | II ? |  17 mm |  | první článek tykadel samců s nepatrnným výrůstkom ukrytým v kropenatých šupinkách, zadní křídla širší než u předchozích dvou druhů |
| <i>Hyatopa binotella</i> (Thunberg, 1794) | IV |  | | |
| <i>Hyatopa segnella</i> (Zeller, 1873) | II ? |  14 mm | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---------|------------------------|-----------------------------|
| <i>Hypatopa inunctella</i> (Zeller, 1839) | II ? | | | |
| <i>Tecmerium perplexum</i> (Gozmány, 1957) | II ? | | | |
| <i>Deuterogonia pudorina</i> (Wocke, 1857) | III | | | Salix? |
| <i>Promalactis procerella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III | | | lišejníky na kmenech stromů |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|--|---|--|
| <i>Fabiola pokornyi</i> (Nickerl, 1864) | II |  | | tlející dřevo především habru |
| <i>Schiffermuelleria schaefferella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  16 mm |  | pod kůrou rozličných dřevin, tlející dřevo |
| <i>Schiffermuelleria grandis</i> (Desvignes, 1842) | III |  | | pod odumřelou kůrou dubů, buků |
| <i>Buvatina tineiformis</i> Laraut, 1984 | II ? | | | tlející dřevo? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|------------------------|------------------------------|
| <i>Denisia stroemella</i> (Fabricius, 1781) | II |  | | les se starými buky |
| <i>Denisia similella</i> (Hübner, 1796) | IV |  14 mm | | tykadla při bázi kroužkovaná |
| <i>Denisia augustella</i> (Hübner, 1796) | II |  | | |
| <i>Denisia albimaculea</i> (Haworth, 1828) | III |  9,5 mm | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|------------------------|-------------------------------|
| <i>Denisia nubilosella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) | I |  17 mm | | vyšší polohy, jehličnaté lesy |
| <i>Denisia stipella</i> (Linnaeus, 1758) | III |  11 mm | | tykadla nejsou kroužkovaná |
| <i>Decantha borkhauseni</i> (Zeller, 1839) | I |  12 mm | | pod kůrou Pinus sylvestris |
| <i>Metalampra cinnamomea</i> (Zeller, 1839) | IV |  10 mm | | tlející opad dřevin |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|------------------------|---|
| <i>Endrosis sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |   | | synantropně v domácnostech, organické materiály |
| <i>Hofmannophila pseudospretella</i> (Stainton, 1849) | IV |   | | různý organický materiál v domácnostech, ptačí hnízda |
| <i>Borkhausenia fuscescens</i> (Haworth, 1828) | IV |  | | různý organický materiál v domácnostech |
| <i>Borkhausenia minutella</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  12 mm | | různý organický materiál v domácnostech, ptačí hnízda |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|------------------------------------|
| <i>Borkhausenia luridicomella</i> (Herrich-Schäffer, 1856) | II |  | | |
| <i>Crassa tinctella</i> (Hübner, 1796) | IV |  |  | tlející dřevo listnatých stromů |
| <i>Crassa unitella</i> (Hübner, 1796) | IV |  |  | pod kůrou odumřelých stromů |
| <i>Batia lambdella</i> (Donovan, 1793) | II |  |  | pod kůrou bobovitých dřevin a keřů |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|--|
| <i>Batia internella</i> Jäckh, 1972 | II |  |  | vychoval jsem na koncových větvičkách Pyrus pyraster na stepním biotopu |
| <i>Batia lunaris</i> (Haworth, 1828) | II |  | | |
| <i>Epicallima bruandella</i> (Ragonot, 1889) | I ? |  |  14,5 mm | |
| <i>Epicallima formosella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  |  | pod kůrou různých listnatých stromů |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|--------------------------------------|
| <i>Dasycera oliviella</i> (Fabricius, 1794) | II |  |  | zetlelé dřevo |
| <i>Oecophora bractella</i> (Linnaeus, 1758) | III |  |  | pod zetlehou kůrou listnatých dřevin |
| <i>Alabonia staintoniella</i> (Zeller, 1850) | II |  | | |
| <i>Harpella forcicella</i> (Scopoli, 1763) | IV |  <small>Genitalia det. - Thür. Ung. Herbolario - Taxonomie Himmlergrind 310m Scopoli 1763: 179 A. Z. 2020/14 leg. L. J. Šimek Bild 17943</small> |  | tlející dřevo listnatých dřevin |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---------|------------------------|----------------------------------|
| <i>Minetia crinitus</i> (Fabricius, 1798) | II ? | | | |
| <i>Minetia labiosella</i> (Hübner, 1810) | ? | | | |
| <i>Minetia criella</i> (Treitschke, 1835) | I | | | Genista pilosa |
| <i>Pleurota marginella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II | | | v předivu na úzkolistých travách |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|--|
| <i>Pleurota pyropella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | I |  | | |
| <i>Pleurota proteella</i> Staudinger, 1880 | I |  | | |
| <i>Pleurota bicostella</i> (Clerck, 1759) | II |  | | Calluna, Erica v předivu |
| <i>Pleurota aristella</i> (Linnaeus, 1767) | II |  |  | v předivové trubičce na bylinách (Salvia, Hippocrepis comosa...) |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---------|------------------------|---------------|
| <i>Holoscolia huebneri</i> Koçak, 1980 | II | | | |
| <i>Aplota palpellus</i> (Haworth, 1828) | II | | | tlející dřevo |
| <i>Aplota nigricans</i> (Zeller, 1852) | II | | | |
| <i>Lypusa maurella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II ? | | | zřejmě detrit |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|--|
| <i>Agnoea latipennella</i> (Jäckh, 1959) | III |  |  | silné zlatohnědé chlupy na hřbetní straně zadečku |
| <i>Agnoea josephinae</i> (Toll, 1956) | IV |  | | dlouhé labiální palpy v porovnání s ostatními druhy |
| <i>Agnoea elsae</i> Svensson, 1982 | III |  | | |
| <i>Agnoea flavifrontella</i> (Denis et Schiffermüller, | III |  |  | v porovnání s A. latipennella je hlava výrazněji žlutá |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|------------------------|---|
| <i>Agnoea subochreella</i> (Doubleday, 1859) | II |  | | |
| <i>Agnoea synchrorella</i> (Jäckh, 1959) | II ? |  | | spíše vyšší polohy |
| <i>Amphisbatis incongruella</i> (Stainton, 1849) | III |  | | na suchých úzkolistých travách, vak z podélne uložených kousků trav |
| <i>Diurnea fagella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  | | jarní |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|----------------|
| <i>Diurnea lipsiella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  23 mm |  | podzimní |
| <i>Dasystoma salicella</i> (Hübner, 1796) | III |  19 mm |  | duben |
| <i>Carcina quercana</i> (Fabricius, 1775) | IV |  17,5 mm | | Quercus, Fagus |
| <i>Perittia farinella</i> (Thunberg, 1794) | II |  | | Boraginaceae? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|--|
| <i>Perittia herrichiella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II |  |  | Lonicera |
| <i>Stephensia brunnicella</i> (Linnaeus, 1767) | II |  |  | Calamintha |
| <i>Stephensia abbreviatella</i> (Stainton, 1851) | I |  | | Myosotis nemorosa |
| <i>Elachista freyerella</i> (Hübner, 1825) | IV |  | | hlava, nebo alespoň čelo bělavé, krční chomáček šedavý, nejčastěji Poa nemoralis v časném jaře v dubohabřinách |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|--|------------------------|---|
| <i>Elachista exactella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | IV |  | | šedá hlava a krční chomáček, stejné barvy jako přední křídla |
| <i>Elachista stabilella</i> (Stainton, 1858) | II ? |  | | hlava a krční chomáček bílé |
| <i>Elachista consortella</i> (Stainton, 1851) | II ? |  6 mm | | čelo bledě béžové, krční chomáček skvrnitý se šupinkami s tmavším vrcholem, světlejší než přední křídla |
| <i>Elachista geminatella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | II |  7 mm | | Luzula sylvatica |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|------------------------------|
| <i>Elachista gleichenella</i> (Fabricius, 1781) | III |  |  | Carex, Luzula |
| <i>Elachista pigerella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) | I |  |  | |
| <i>Elachista quadripunctella</i> (Hübner, 1825) | II |  | | Luzula luzuloides, L. pilosa |
| <i>Elachista biatomella</i> (Stainton, 1848) | I |  | | Carex flacca |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|---|---|
| <i>Elachista martini</i> Hofmann, 1898 | I |  | | Carex humilis od podzimu do jara, pohybuje se směrem dolů |
| <i>Elachista tetragonella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II |  | | Carex monrana |
| <i>Elachista occidentalis</i> Frey, 1882 | I |  |  | Carex digitata v dubohabřinách teplých poloh - Český kras |
| <i>Elachista juliensis</i> Frey, 1870 | I |  | | Carex humilis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|--|
| <i>Elachista serricornis</i> (Stainton, 1854) | II |  | | |
| <i>Elachista trapeziella</i> (Stainton, 1849) | I |   | | Luzula pilosa, stinné lesy |
| <i>Elachista cinereopunctella</i> (Haworth, 1828) | I |  |  | Carex flacca, C. pilosa |
| <i>Elachista eleochariella</i> Stainton, 1851 | II |  |  | Carex flacca, C. panicea, Eriophorum angustifolium, Eleocharis palustris |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|------------------------|--|
| <i>Elachista utonella</i> (Frey, 1856) | III |  8 mm | | Carex acuta, C. acutiformis, C. vesicaria a další mohutné ostřice v olšinách |
| <i>Elachista scirpi</i> Stainton, 1887 | II |  10 mm | | Bolboschoenus maritimus, Juncus gerardii, Juncus compressus... |
| <i>Elachista albidella</i> (Nylander, 1848) | II |  9 mm | | Eleocharis, Eriophorum, Carex, Deschampsia cespitosa, Poa palustris... |
| <i>Elachista contaminella</i> Zeller, 1847 | I | | | Carex distans |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|--|
| <i>Elachista poae</i> Stainton, 1855 | I |  |  | Glyceria aquatica |
| <i>Elachista atricomella</i> Stainton, 1849 | III |  12 mm | | Carex hostiana?, Dactylis glomerata |
| <i>Elachista kilmunella</i> Stainton, 1849 | II |  | | |
| <i>Elachista alpinella</i> Stainton, 1854 | II |  | | Carex riparia, C. acuta, C. acutiformis, C. paniculata |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|------------------------|--|
| <i>Elachista diederichsiella</i> Hering, 1889 | I |  | | Milium effusum, Holcus mollis - stinná místa |
| <i>Elachista compsa</i> Traugott-Olsen, 1974 | II |  | | 8 - 11 mm |
| <i>Elachista elegans</i> Frey, 1859 | II |  | | 6,5 - 8 mm, Calamagrostis arundinacea |
| <i>Elachista luticomella</i> Zeller, 1839 | III |  10,5 mm | | Dactylis glomerata, Milium effusum, Festuca gigantea |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|------------------------|--|
| <i>Elachista albifrontella</i> (Hübner, 1817) | IV |  9 mm | | Holcus mollis, Brachypodium, Dactylis, Bromus, Poa... |
| <i>Elachista bifasciella</i> Treitschke, 1833 | III |  | | Deschampsia flexuosa, stinná místa |
| <i>Elachista nobilella</i> Zeller, 1839 | III |  | | Deschampsia flexuosa - podrost smrkových a borových lesů |
| <i>Elachista apicipunctella</i> Stainton, 1849 | III |  | | Milium effusum, Festuca gigantea |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|---|--|
| <i>Elachista subnigrella</i> Douglas, 1853 | III |  |  | Bromus erectus, Helictotrichon pubescens |
| <i>Elachista herrichi</i> Frey, 1859 | II |  | | Koeleria pyramidata |
| <i>Elachista orstadii</i> Palm, 1943 | II ? |  |  | |
| <i>Elachista pomerana</i> Frey, 1870 | II |  | | Poa pratensis, polyfágní |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|------------------------|---|
| <i>Elachista griseella</i> (Duponchel, 1843) | II |  | | Elytrigia repens |
| <i>Elachista humilis</i> Zeller, 1850 | II |  | | Deschampsia cespitosa |
| <i>Elachista canapennella</i> (Hübner, 1813) | IV |  | | Agrostis sp. div., Poa sp. div., Holcus mollis... |
| <i>Elachista anserinella</i> Zeller, 1839 | I |  | | Brachypodium pinnatum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|---|
| <i>Elachista lastrella</i> Chrétien, 1896 | I |  |  | Bromus erectus |
| <i>Elachista rufocinerea</i> (Haworth, 1828) | I ? |  | | Holcus mollis, luční biotopy, okraje křovin |
| <i>Elachista maculicerusella</i> Bruand, 1859 | IV |  |  | Phalaris arundinacea, Phragmites |
| <i>Elachista argentella</i> (Clerck, 1759) | IV |  | | Gramineae - polyfág |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---|------------------------|--|
| <i>Elachista pollutella</i> (Duponchel, 1843) | I |  14 mm | | |
| <i>Elachista pollinariella</i> Zeller, 1839 | III |  | | suchomilné úzkolisté trávy - Festuca sp. div. |
| <i>Elachista gormella</i> Nielsen et Traugor-Olsen, 1987 | II ? |  9 mm | | |
| <i>Elachista heringi</i> Rebel, 1899 | I |  14 mm | | Stipa pennata |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|------------------------|---|
| <i>Elachista hedemanni</i> Rebel, 1899 | I |  | | Carex humilis |
| <i>Elachista disertella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I |  | | Phleum |
| <i>Elachista triatomea</i> (Haworth, 1828) | I ? |  | | Festuca filiformis - Roste na písčinách, suchých loukách, pastvinách, vřesovištích, na okrajích lesů, v sušších partiích rašelinišť. Součást vegetace krátkostébelných porostů; vyhledává živinami chudé nevápenné půdy. Velmi často ji v louce najdeme na starých zarostlých mrazeništích. |
| <i>Elachista collitella</i> (Duponchel, 1843) | I |  | | Festuca ovina (Poa pratensis, Koeleria pyramidata) |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|--|
| <i>Elachista agelensis</i> Traugott-Olsen, 1996 | I ? |  7 mm | | |
| <i>Elachista subocellea</i> (Stephens, 1834) | II |  | | Brachypodium sylvaticum - lesní okraje |
| <i>Elachista festucicolella</i> Zeller, 1859 | I |  | | |
| <i>Elachista nitidulella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I |  6,5 mm |  6 mm | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|-----------------------------|--|
| <i>Elachista spumella</i> Caradja, 1920 | II |  | | Festuca psammophila - bory na píska, jen Bzenecko, Záhorie |
| <i>Elachista distigmatella</i> Frey, 1859 | II |  | | Festuca trachyphylla - písčité bory, skalní stepi |
| <i>Elachista dispilella</i> Zeller, 1839 | II |  | | rub předních křídel s hrubými světle hnědými šupinkami, cf. elsaella |
| <i>Elachista triseriatella</i> Stainton, 1854 | II |  | syn.: gregori Traugot-Olsen | křídla štíhlá, rub předních křídel jednolitě jemně světle hnědý, k apexu světlejší |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|---|
| <i>Elachista elsaella</i> Traugot-Olsen, 1988 | II |  | syn.: <i>svenssoni</i> Traugot-Olsen | rub předních křídel světle hnědý, světleji než u <i>E. dispilella</i> , tykadla tmavší než u <i>E. dispilella</i> |
| <i>Elachista dispunctella</i> (Duponchel, 1843) | II |  | | Festuca pallens, sklaní xerotermní stanoviště |
| <i>Elachista rudentella</i> Stainton, 1851 | I |  |  | Phleum phleoides |
| <i>Elachista squamosella</i> (Duponchel, 1843) | II |  | | |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|------------------------|--|
| <i>Elachista bedellella</i> (Sircom, 1848) | IV |  | | Helictotrichon pubescens, Poa, Festuca ovina |
| <i>Elachista littoricola</i> Le Marchand, 1938 | I |  | | Elytrigia repens |
| <i>Elachista pullicomella</i> Zeller, 1839 | IV |  8 mm | | Trisetum flavescens, Poa pratensis... |
| <i>Elachista chrysodesmella</i> Zeller, 1850 | III |  6,5 mm | | Brachypodium pinnatum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|--|---|--|
| <i>Elachista obliquella</i> Stainton, 1854 | III |  |  | |
| <i>Elachista fasciola</i> Parenti, 1983 | I ? |  |  | Calamagrostis arundinacea |
| <i>Elachista metella</i> Kaila, 2002 | II ? |  |  | |
| <i>Elachista cingillella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | I ? |  7 mm | | Milium effusum? Oproti E. metella nutno kriticky odlišit |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|--|
| <i>Elachista unifasciella</i> (Haworth, 1828) | III |  | | Dactylis glomerata, ... |
| <i>Elachista gangabella</i> Zeller, 1850 | III |  |  | Brachypodium sylvaticum |
| <i>Elachista subalbidella</i> Schläger, 1847 | III |  | | Molinia caerulea, Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum |
| <i>Elachista adscitella</i> Stainton, 1851 | III |  | | Calamagrostis arundinacea, Deschampsia cespitosa, Poa palustris... |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|--|
| <i>Elachista bisulcella</i> (Duponchel, 1843) | III |  | | Deschampsia cespitosa, Calamagrostis epigejos, Brachypodium sylvaticum |
| <i>Semioscopis avellanella</i> (Hübner, 1793) | IV |  |  | Betula, Carpinus |
| <i>Semioscopis oculella</i> (Thunberg, 1794) | III |  | | Betula, Carpinus |
| <i>Semioscopis steinkellneriana</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |  |  | Crataegus, Sorbus, Prunus, Fraxinus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|---|--------------------|
| <i>Semioscopis strigulana</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | I |  | | Populus tremula |
| <i>Luquetia lobella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | I |  |  | Prunus spinosa |
| <i>Levipalpus hepatariella</i> (Lienig et Zeller, 1846) | II |  |  | Antennaria dioica? |
| <i>Exaeretia allisella</i> Stainton, 1849 | I |  | | Artemisia vulgaris |
| | II | | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Exaeretia ciniflonella</i> Lienig et Zeller, 1846 | III |  | | Bupleurum, Meum athamaticum, Athamantha |
| <i>Exaeretia preisseckeri</i> (Rebel, 1937) | ? |  | | |
| <i>Exaeretia stramentella</i> (Eversmann, 1844) | I |  | | Pyrethrum corymbosum |
| <i>Agonopterix ocellana</i> (Fabricius, 1775) | III |  |  | Salix, Populus |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|---------------------------------------|
| <i>Agonopterix adspersella</i> (Kollar, 1835) | II |  |  | Bupleurum |
| <i>Agonopterix conterminella</i> (Zeller, 1839) | II |  |  | Salix caprea, S. aurita, S. viminalis |
| <i>Agonopterix lituosa</i> (Haworth, 1811) | IV |  |  | Hypericum |
| <i>Agonopterix hypericella</i> (Hübner, 1817) | III |  |  | Hypericum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|--|
| <i>Agonopterix oinochroa</i> (Turatti, 1879) | I |  |  | |
| <i>Agonopterix alstromeriana</i> (Clerck, 1759) | III |  19 mm | | Conium maculatum |
| <i>Agonopterix heracliana</i> (Linnaeus, 1758) | IV |  21 mm |  | Anthriscus, Heracleum, atd. Nohy nejsou světle a tmavě kroužkované. Šupinky na spodní straně prvního makadlového článku zabarveny do růžova. |
| <i>Agonopterix ciliella</i> (Stainton, 1849) | IV |  26 mm |  | Angelica, Laserpitium, Chaerophyllum, Daucus, Torylis, Pastinaca... Všechny nohy světle a tmavě kroužkované. |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|---------------------------------|
| <i>Agonopterix selini</i> (Heinemann, 1870) | II |  17,5 mm |  | Peucedanum, Selinum, Ligusticum |
| <i>Agonopterix paraselini</i> Buchner, 2017 | I |  16,5 mm |  | Peucedanum cervaria |
| <i>Agonopterix putridella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | I |  |  | Peucedanum alsaticum |
| <i>Agonopterix hippomarathri</i> (Nickerl, 1864) | I |  18 mm |  | Seseli hippomarathrum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---------------------------------------|
| <i>Agonopterix parilella</i> (Treitschke, 1835) | II |  |  | Peucedanum oreoselinum |
| <i>Agonopterix curvipunctosa</i> (Haworth, 1813) | III |  16,5 mm | | <i>Anthriscus caucalis</i> |
| <i>Agonopterix cnicella</i> (Treitschke, 1832) | II |  |  | <i>Eryngium campestre</i> |
| <i>Agonopterix capreolella</i> (Zeller, 1839) | III |  |  | <i>Pimpinella saxifraga, Falcaria</i> |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|--|
| <i>Agonopterix purpurea</i> (Haworth, 1811) | II |  |  | Daucus carota |
| <i>Agonopterix yeatiana</i> (Fabricius, 1781) | II |  | | Daucus carota, Carum carvi |
| <i>Agonopterix astrantiae</i> (Heinemann, 1870) | II |  |  | Astrantia major, Sanicula europaea |
| <i>Agonopterix angelicella</i> (Hübner, 1813) | II |  |  | Angelica sylvestris, Heracleum sphondylium |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|---|
| <i>Agonopterix senecionis</i> (Nickerl, 1864) | I |  17,5 mm |  | Senecio fuchsii |
| <i>Agonopterix nanatella</i> (Stainton, 1849) | II |  16 mm  |  | Carlina vulgaris, často více housenek na jedné rostlině |
| <i>Agonopterix kaekeritziana</i> (Linnaeus, 1767) | II |  21,5 mm |  | Centaurea scabiosa |
| <i>Agonopterix bipunctosa</i> (Curtis, 1850) | I | | | |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Agonopterix pallorella</i> (Zeller, 1839) | II |  23,5 mm |  | Centaurea scabiosa, Serratula tinctoria |
| <i>Agonopterix laterella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  22 mm |  | Genista, Sarothamnus, Centaurea, makadla hnědožlutá, střední článek poprášený řídce tmavými šupinkami, koncový článek se dvěma tmavými obroučkami |
| <i>Agonopterix carduella</i> (Hübner, 1817) | I |  18 mm |  | Cirsium, Centaurea |
| <i>Agonopterix arenella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  18 mm |  | Arctium, Cirsium, Serratula |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|--|
| <i>Agonopterix propinquella</i> (Treitschke, 1835) | III |  18 mm |  | Arctium, Cirsium, Serratula, Carduus - makadla tmavě šedá |
| <i>Agonopterix subpropinquella</i> (Stainton, 1849) | II |  22 mm |  | Cirsium, Centaurea, Sarothamnus - makadla světle žlutá, střední článek poprášený nevýrazně tmavými šupinkami, konečný článek se dvěma obroučkami a tmavým koncem |
| <i>Agonopterix doronicella</i> (Wocke, 1849) | I |  18 mm |  | Doronicum austriacum, sepředené listy a květy |
| <i>Agonopterix petasitis</i> (Standfuss, 1851) | I |  18 mm |  | Petasites hybridus, P. albus, P. officinalis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|--|
| <i>Agonopterix scopariella</i> (Heinemann, 1870) | III |  |  | Cytisus, Genista, Laburnum anagyroides |
| <i>Agonopterix atomella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Genista, Cytisus |
| <i>Agonopterix assimilella</i> (Treitschke, 1832) | III |  |  | Genista, Cytisus, Sarothamnus |
| <i>Agonopterix nervosa</i> (Haworth, 1811) | III |  |  | Genista, Cytisus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|---------------------|
| <i>Agonopterix furvella</i> (Treitschke, 1832) | I |  25 mm |  | Dictamnus albus |
| <i>Agonopterix medelichensis</i> Buchner, 2015 | II |  | | Daucus carota |
| <i>Depressaria emeritella</i> Stainton, 1849 | II |  24,5 mm |  | Tanacetum vulgare |
| <i>Depressaria olerella</i> Zeller, 1854 | III |  20,5 mm |  | Tanacetum, Achillea |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---|
| <i>Depressaria albipunctella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  20 mm |  | Chaerophyllum, Daucus, Anthriscus, Pimpinella |
| <i>Depressaria pulcherrimella</i> Stainton, 1849 | II |  |  | Cnidium, Daucus, Pimpinella major, Chaerophyllum... |
| <i>Depressaria douglasella</i> Stainton, 1849 | III |  |  | Daucus carota |
| <i>Depressaria beckmanni</i> Heinemann, 1870 | III | |  | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---|--|-----------------------------|
| <i>Depressaria sordidatella</i> Tengström, 1848 | I |  20 mm <i>Brenner Mauritius</i> |  | Anthriscus |
| <i>Depressaria hofmanni</i> Stainton, 1861 | II ? |  |  | <i>Libanotis pyrenaica</i> |
| <i>Depressaria badiella</i> (Hübner, 1796) | III |  24.5 mm |  | Heracleum |
| <i>Depressaria pimpinellae</i> Zeller, 1839 | II |  |  | <i>Pimpinella saxifraga</i> |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Depressaria radiella</i> (Goeze, 1783) | IV |  27 mm |  | Pastinaca, Heracleum |
| <i>Depressaria libanotidella</i> Schläger, 1849 | II |  |  | Libanotis, Laserpitium |
| <i>Depressaria cervicella</i> Herrich-Schäffer, 1854 | ? |  26 mm | | Trinia glauca (bezobalka sivá) jižní Morava, nejistý údaj o živné rostlině |
| <i>Depressaria bupleurella</i> Heinemann, 1870 | II |  |  | Bupleurum falcatum v listové trubičce |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|---|
| <i>Depressaria daucella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III |  22 mm |  | Daucus, Carum, Cicuta, Oenanthe, Pastinaca... |
| <i>Depressaria ultimella</i> Stainton, 1849 | I |  |  | Oenanthe, Sium latifolium - uvnitř stonku ve spodní části |
| <i>Depressaria chaerophylli</i> Zeller, 1839 | III |  21,5 mm |  | Chaerophyllum bulbosum, Ch. aureum, v okolících |
| <i>Depressaria floridella</i> (Mann, 1864) | I ? |  20 mm |  | Seseli sp. div. |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Depressaria depressana</i> (Fabricius, 1775) | IV |  14 mm |  | Daucaceae, v okolících |
| <i>Depressaria artemisiae</i> Nickerl, 1862 | I |  |  | Artemisia campestris |
| <i>Depressaria absynthiella</i> Herrich-Schäffer, 1865 | I |  |  | Artemisia absinthium, mezi sepředenými listy |
| <i>Depressaria silesiaca</i> Heinemann, 1879 | II |  16 mm |  | Artemisia vulgaris, Achillea millefolium, Tanacetum vulgare |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|---------------------------|
| <i>Orophia ferrugella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | III | | | Campanula persicifolia |
| <i>Orophia denisella</i> (Fabricius, 1787) | ? | | | živná rostlina není známa |
| <i>Orophia sordidella</i> (Hübner, 1796) | II | | | Onobrychis |
| <i>Telechrysis tripuncta</i> (Haworth, 1828) | II | | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---------|------------------------|---|
| <i>Fuchsia luteella</i> (Heinemann, 1870) | I | | | Peucedanum cervaria |
| <i>Hypercallia citrinalis</i> (Scopoli, 1763) | II | | | Polygala chamaebuxus, P. vulgaris?, západník na mladých výhoncích |
| <i>Anchinia daphnella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | I | | | Daphne mezereum |
| <i>Anchinia cristalis</i> (Scopoli, 1763) | I | | | Daphne mezereum |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|--|---|--|
| <i>Ethmia dodecea</i> (Haworth, 1828) | I |  |  | Lithospermum, Cynoglossum, v srpnu hromadně na listech |
| <i>Ethmia quadrillella</i> (Goeze, 1783) | III |  |  | Symphytum officinale, S. tuberosum, Pulmonaria |
| <i>Ethmia candidella</i> (Alphéraky, 1908) | I |  |  | Lithospermum, Cerinthe, Borago |
| <i>Ethmia fumidella</i> (wocke, 1850) | II ? |  | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|--|
| <i>Ethmia pusiella</i> (Linnaeus, 1758) | I |  |  | Cerinthe, Lithospermum, Pulmonaria, Borago |
| <i>Ethmia terminella</i> Fletcher, 1938 | II |  |  | Echium |
| <i>Ethmia bipunctella</i> (Fabricius, 1775) | III |  |  | Echium, Cynoglossum |
| <i>Blastodacna hellerella</i> (Duponchel, 1838) | III |  | | Crataegus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|---|---|
| <i>Blastodacna atra</i> (Haworth, 1828) | IV |  | | Crataegus, Malus |
| <i>Blastodacna vinolentella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) | II ? |  | | Crataegus, Malus |
| <i>Spuleria flavicaput</i> (Haworth, 1828) | II |  |  | Crataegus - ve dřeni nejmladších bočních větví, oválným otvorem je vyhazován trus |
| <i>Heinemannia laspeyrella</i> (Hübner, 1796) | II |  | | Lathyrus, Vicia, Trifolium, v červenci a srpnu v luscích |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|---|
| <i>Heinemannia festivella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  16,5 mm | | Solidago virgaurea - nepotvrzený údaj |
| <i>Dystebenna stephensi</i> (Stainton, 1849) | I |  9 mm |  | Quercus, Castanea - pod kůrou velkých jedinců |
| <i>Haplochrois ochraceella</i> Rebel, 1903 | ? |  | | ? |
| <i>Chrysoclista linneella</i> (Clerck, 1759) | II |  | | Tilia - pod kůrou, staré ořezávané stromy v alejích, prozrazuje se trusem |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|--|
| <i>Chrysoclista lathamella</i> Fletcher, 1936 | I |  |  | Salix alba, S. caprea, S. cinerea?, S. fragilis? - pod kůrou starých vrb, prozrazuje se trusem |
| <i>Chrysoclista splendida</i> Karsholt, 1997 | I |  |  | Salix alba, S. purpurea, S. fragilis - pod kůrou kmenů a větví, včetně míst napadených bejlomorkou korovou, viz foto |
| <i>Chrysoclista gabretica</i> Šumpich, 2012 | ? | | | holotyp pochází z klimaxové smrčiny Šumavy |
| <i>Chrysoclista germanica</i> Šumpich et Huemer, 2016 | ? | | | pod kůrou stromů od srpna do jara, kterých stromů - neznámo |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|---|
| <i>Stathmopoda pedella</i> (Linnaeus, 1761) | II |  | | v září v zelených šištičkách olší - hnědé skvrny, trus |
| <i>Batrachedra praeangusta</i> (Haworth, 1828) | IV |  |  | Populus nigra, P. alba, Salix alba, S. caprea - nádorky na větvičkách |
| <i>Batrachedra pinicolella</i> (Zeller, 1839) | III |  |  | Picea, Abies, vyšší polohy - sepředené jehlice s trusem |
| <i>Batrachedra confusella</i> Berggren, Aarvik, Huemer, Lee et Mutanen, 2022 | IV |  | | Pinus sylvestris, Larix decidua - minuje jehlice |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|---|
| <i>Batrachedra parvulipunctella</i> Chrétien, 1915 | I |  16 mm | | prý v chomáčcích vosku pokrývající červce Aclerda berlesii Buffa, 1897, který žije na rákosu, velmi neurčitá bionomie |
| <i>Augasma aeratella</i> (Zeller, 1839) | II |  10 mm |  | <i>Polygonum arenastrum, aviculare</i> |
| <i>Coleophora lutarea</i> (Haworth, 1828) | III |  | | <i>Stellaria holostea</i> - v tobolkách |
| <i>Coleophora auroguttella</i> Fischer von Röslerstamm, 1841 | I |  | | <i>Atriplex halimus</i> |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|---|
| <i>Coleophora albella</i> (Thunberg, 1788) | II |  |  | Silene nutans, S. vulgaris, S. cucubalus, S. viscaria - na tobolkách |
| <i>Coleophora spiraeella</i> Rebel, 1916 | IV |  10 mm |  | Spiraea |
| <i>Coleophora lutipennella</i> (Zeller, 1838) | III |  |  | Quercus, př. kř. hustě pokrytá tmavě hnědými šupinkami, křídlo se zdá být hrubé, tmavé šupinky na rubu př.kř. až do apexu, u <i>C. flavipennella</i> je apex světlý (rub) |
| <i>Coleophora ochripennella</i> Zeller, 1849 | IV |  12 mm |  | Ballota, <i>Stachys sylvatica</i> |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|---|
| <i>Coleophora gryphipennella</i> (Hübner, 1796) | IV |  14 mm |  | Rosa |
| <i>Coleophora flavipennella</i> (Duponchel, 1843) | IV |  12,5 mm |  | Quercus, nezřetelně světlejší kostální okraj př. kř. |
| <i>Coleophora adjectella</i> Herrich-Schäffer, 1861 | III |  |  | Prunus sp. div. |
| <i>Coleophora milvipennis</i> Zeller, 1839 | III |  |  | Betula, Carpinus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|--------------------------|
| <i>Coleophora alnifoliae</i> Barasch, 1934 | III | | | Alnus |
| <i>Coleophora badiipennella</i> (Duponchel, 1843) | III | | | Ulmus |
| <i>Coleophora limosipennella</i> (Duponchel, 1843) | II | | | Ulmus |
| <i>Coleophora siccifolia</i> Stainton, 1856 | IV | | | Betula, Crataegus, Malus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---------|------------------------|--|
| <i>Coleophora uliginosella</i> Glitz, 1872 | II | | | Vaccinium uliginosum, na podzim dorostlá |
| <i>Coleophora coracipennella</i> (Hübner, 1796) | IV | | | Malus, Prunus, Crataegus |
| <i>Coleophora serratella</i> (Linnaeus, 1761) | IV | | | Betula |
| <i>Coleophora spinella</i> (Schrank, 1802) | IV | | | Pyrus, Prunus, Malus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---------|------------------------|---|
| <i>Coleophora prunifoliae</i> Doets, 1944 | IV | | | Prunus, Malus, Pyrus |
| <i>Coleophora hydrolapathella</i> Hering, 1921 | I | | | Rumex hydrolapathum |
| <i>Coleophora cecidophorella</i> Oudejans, 1972 | I | | | Fallopia convolvulus, F. dumetorum v hálce jako Augasma aeratellum |
| <i>Coleophora trigeminella</i> Fuchs, 1881 | III | | | Sorbus, Prunus, malus, Amelanchier, Crataegus |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|-----------------------|
| <i>Coleophora cornutella</i> Herrich-Schäffer, 1861 | I |  13 mm <i>Staudg. Germany: 1866</i> |  8 mm | Betula |
| <i>Coleophora fuscocuprella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | III |  |  | Corylus |
| <i>Coleophora lusciniaeepennella</i> (Treitschke, 1833) | III |  |  | Salix |
| <i>Coleophora idaeella</i> Hofmann, 1869 | I |  13 mm <i>Friedl. Staudg. et al. Vinc. ongeec.</i> |  | Vaccinium vitis-idaea |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---------------------------------|
| <i>Coleophora vacciniella</i> Herrich-Schäffer, 1861 | III |  13 mm |  | Vaccinium, Betula |
| <i>Coleophora ledi</i> Stainton, 1860 | I |  11 mm |  | Ledum palustre |
| <i>Coleophora vitisella</i> Gregson, 1856 | I |  13 mm |  | Vaccinium vitis-idaea |
| <i>Coleophora glitzella</i> Hofmann, 1869 | II |  13 mm |  | Vaccinium vitis-idaea do května |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|--|
| <i>Coleophora murinella</i> Tengström, 1847 | I |  | | Vaccinium vitis-idaea |
| <i>Coleophora violacea</i> (Ström, 1783) | IV |  |  | Prunus sp. div. |
| <i>Coleophora potentillae</i> Elisha, 1885 | II |  |  | Agrimonia, Filipendula vulgaris, Rubus, Potentilla |
| <i>Coleophora juncicolella</i> Stainton, 1851 | I |  |  | Calluna |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|-------------------------------|
| <i>Coleophora orbitella</i> Zeller, 1849 | III |  |  | Alnus, Betula |
| <i>Coleophora binderella</i> (Kollar, 1832) | III |  |  | Alnus, Corylus |
| <i>Coleophora ahenella</i> Heinemann, 1876 | IV |  |  | Alnus, Prunus, Rubus atd. |
| <i>Coleophora albitalisella</i> Zeller, 1849 | II |  |  | Clinopodium, Salvia pratensis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|--|
| <i>Coleophora pulmonariella</i> Ragonot, 1874 | II |  |  | Pulmonaria, Myosotis |
| <i>Coleophora variicornis</i> Toll, 1952 | I |  | | Trifolium arvense, př. kř. tmavě měděně zlatě leská oproti C. aleramica - zelenavě zlatá, šupinky uspořádané do zřetelných podélných vln |
| <i>Coleophora trifolii</i> (Curtis, 1832) | IV |  |  | Melilotus albus, M. officinalis, čelo žluté |
| <i>Coleophora frischella</i> (Linnaeus, 1758) | III |  | | čelo stejně barvy jako temeno, př. kř. u kořene a ve středu zelevě zlaté, většinou květen - červen |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---|
| <i>Coleophora alcyonipennella</i> (Kollar, 1832) | III |  |  | Trifolium, čelo stejné barvy jako temeno, př. kř. u kořene a ve středu měděně zlaté, většinou červenec- srpen |
| <i>Coleophora conyzae</i> Zeller, 1868 | I |  13 mm |  | Inula conyza |
| <i>Coleophora ptarmicia</i> Walsingham, 1910 | II |  | | Achillea millefolium, A. ptarmica, A. setacea |
| <i>Coleophora lineolea</i> (Haworth, 1828) | III |  |  | Stachys, Betonica |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|---|-----------------------------------|
| <i>Coleophora hemerobiella</i> (Scopoli, 1763) | IV |  |  | Prunus, Crataegus... |
| <i>Coleophora lithargyrinella</i> Zeller, 1849 | IV |  |  8 mm | Stellaria holostea, Silene nutans |
| <i>Coleophora onobrychiella</i> Zeller, 1849 | I |  14 mm |  | Astragalus |
| <i>Coleophora medelichensis</i> Krone, 1908 | I |  11 mm |  | Dorycnium |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|---|
| <i>Coleophora colutella</i> (Fabricius, 1794) | III |  |  | Lotus corniculatus, Astragalus glycyphyllos |
| <i>Coleophora trifariella</i> Zeller, 1849 | III |  |  7 mm | Laburnum anagyroides, Cytisus nigricans |
| <i>Coleophora genistae</i> Stainton, 1857 | I |  gall m. const. 11 mm |  | Genista pilosa |
| <i>Coleophora saturatella</i> Stainton, 1850 | III |  |  | Sarothamnus, Genista |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|------------|
| <i>Coleophora niveicostella</i> Zeller, 1839 | I |  | | Thymus |
| <i>Coleophora albicostella</i> (Duponchel, 1842) | III |  |  | Potentilla |
| <i>Coleophora sergiella</i> Falkovitsh, 1979 | I |  | | |
| <i>Coleophora squamella</i> Constant, 1885 | I |  |  | Dorycnium |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|-----------------------------------|
| <i>Coleophora discordella</i> Zeller, 1849 | III |  |  | Lotus corniculatus, L. uliginosus |
| <i>Coleophora acrisella</i> Millière, 1872 | I |  12 mm |  | Dorycnium |
| <i>Coleophora bilineatella</i> Zeller, 1849 | I |  14 mm |  | Dorycnium |
| <i>Coleophora vulpecula</i> Zeller, 1849 | I |  15 mm <small>c.C. 2917.98 leuis. onobrychis Hohenfels</small> |  | Onobrychis |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---|
| <i>Coleophora congeriella</i> Staudinger, 1859 | I |  11 mm |  6 mm | Dorycnium |
| <i>Coleophora chalcogrammella</i> Zeller, 1839 | II |  |  5 mm | Cerastium arvense |
| <i>Coleophora deauratella</i> Lienig et Zeller, 1846 | III |  12 mm |  | Trifolium pratense, T. medium, T. hybridum |
| <i>Coleophora amethystinella</i> Ragonot, 1885 | ? |  | | Vicia tetrasperma, V. cracca?, V. angustifolia? - na luscích se zelenými semeny |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|---|
| <i>Coleophora mayrella</i> (Hübner, 1813) | II |  | | Trifolium repens, T. arvense (Baldizzone) - ve strboulech |
| <i>Coleophora paramayrella</i> Nel, 1993 | II |  11 mm |  | Trifolium ochroleucon, T. rubens - ve strboulech |
| <i>Coleophora aleramica</i> Baldizzone et Stübner, 2007 | I |  EICHENBERGER 5646 PR 1888 PHOTOF I. | | dle mého pozorování T. medium - ve strboulech |
| <i>Coleophora hieronella</i> Zeller, 1849 | I |  11 mm | | Trifolium stellatum, T. angustifolium, tyto druhy ovšem v ČR nerostou |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Coleophora ballotella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1839) | III |  |  | Ballota nigra |
| <i>Coleophora anatipennella</i> ((Hübner, 1796)) | IV |  |  | ovocné dřeviny |
| <i>Coleophora albidella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Salix |
| <i>Coleophora kuehnella</i> (Goeze, 1783) | III |  17 mm |  | Quercus na rozvíjejících se pupenech, neminuje, ale skeletuje |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|----------------|
| <i>Coleophora ibipennella</i> Zeller, 1849 | III |  |  | Quercus |
| <i>Coleophora betulella</i> Heinemann, 1876 | II |  13 mm |  | Betula |
| <i>Coleophora zelleriella</i> Heinemann, 1854 | II |  14 mm |  | Salix |
| <i>Coleophora currucipennella</i> Zeller, 1839 | II |  12 mm |  | Quercus, Fagus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|--------------------|
| <i>Coleophora pyrrhulipennella</i> Zeller, 1839 | I |  |  | Calluna |
| <i>Coleophora brevipalpella</i> Wocke, 1874 | II |  |  | Centaurea, Arctium |
| <i>Coleophora serratulella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I ? |  |  | Jurinea cyanoides |
| <i>Coleophora virgatella</i> Zeller, 1849 | II |  |  | Salvia nemorosa |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|--|---------------------|
| <i>Coleophora mareki</i> Tabell & Baldizzone, 2014 | II |  17 mm |  | Teucrium chamaedrys |
| | I |  16 mm |  | Origanum, Thymus |
| <i>Coleophora serpylletorum</i> Hering, 1889 | I |  19 mm |  | Stachys recta |
| | II |  |  | Stachys recta |
| <i>Coleophora auricella</i> (Fabricius, 1794) | | | | |
| <i>Coleophora paucinotella</i> Toll, 1961 | | | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|---|
| <i>Coleophora gallipennella</i> (Hübner, 1796) | III |  19 mm |  | Astragalus cicer, A. glycyphyllos, Lotus corniculatus |
| <i>Coleophora stramentella</i> Zeller, 1849 | I |  19 mm | | Astragalus onobrychis - lusky |
| <i>Coleophora dignella</i> Toll, 1961 | I |  20 mm | | Onobrychis |
| <i>Coleophora coronillae</i> Zeller, 1849 | II |  15 mm | | Securigera varia, Lathyrus, Astragalus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---|
| <i>Coleophora vibicigerella</i> Zeller, 1839 | I |  16 mm |  8 mm | Artemisia pontica, A. campestris, A. vulgaris, Achillea millefolium |
| <i>Coleophora conspicuella</i> Zeller, 1849 | III |  17,5 mm |  | Asteraceae |
| <i>Coleophora partitella</i> Zeller, 1849 | II |  |  | Tanacetum, Chrysanthemum, Achillea |
| <i>Coleophora ditella</i> Zeller, 1849 | I |  17 mm |  | Artemisia campestris |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|---|
| <i>Coleophora fuscociliella</i> Zeller, 1849 | II |  10 mm |  | Medicago sativa, M. sp. div., květen - červen |
| <i>Coleophora pseudoditella</i> Baldizzone et Patzak, 1983 | I |  13,5 mm |  | Aster linosyris |
| <i>Coleophora astragalella</i> Zeller, 1849 | I |  15,5 mm |  | Astragalus onobrychis |
| <i>Coleophora caelebipennella</i> Zeller, 1839 | III |  21,5 mm |  | Artemisia campestris, Tanacetum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|-------------------|
| <i>Coleophora vibicella</i> (Hübner, 1813) | I |  |  | Genista tinctoria |
| <i>Coleophora vicinella</i> Zeller, 1849 | II |  14 mm |  10 mm | Medicago falcata |
| <i>Coleophora ochrea</i> (Haworth, 1828) | I |  |  | Helianthemum |
| <i>Coleophora lixella</i> Zeller, 1849 | III |  18 mm | | Thymus, trávy |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|---|---|
| <i>Coleophora ornatipennella</i> (Hübner, 1796) | III |  22 mm (m) |  | Salvia, trávy |
| <i>Coleophora oriolella</i> Zeller, 1849 | I |  11 mm |  | Dorycnium |
| <i>Coleophora hartigi</i> Toll, 1959 | I |  14 mm Italien - Fruili, TR Bassovizza Sud, 380 m Bosco Bezzoni 20.5.2010 LF leg. H. Deutsch | | Genista germanica |
| <i>Coleophora vulnerariae</i> Zeller, 1839 | I |  13 mm | | Anthyllis vulneraria - květy a plodenství |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|--|-------------------|
| <i>Coleophora glaseri</i> Toll, 1961 | I |  | | Genista tinctoria |
| <i>Coleophora supinella</i> Ortner, 1949 | I |  13 mm | | Cytisus supinus |
| <i>Coleophora pennella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  16 mm |  | Echium, Anchusa |
| <i>Coleophora laricella</i> (Hübner, 1817) | IV |  |  | Larix |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|--------------------|
| <i>Coleophora adjunctella</i> Hodgkinson, 1882 | I ? | | | Juncus gerardi |
| <i>Coleophora caespititiella</i> Zeller, 1839 | III | | | Juncus |
| <i>Coleophora tamesis</i> Waters, 1929 | I | | | Juncus articulatus |
| <i>Coleophora glaucicolella</i> Wood, 1892 | III | | | Juncus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|------------------------------|
| <i>Coleophora otidipennella</i> (Hübner, 1817) | III |  | | Luzula campestris, silesiaca |
| <i>Coleophora alticolella</i> Zeller, 1849 | IV |  |  | Juncus |
| <i>Coleophora taeniipennella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I |  |  | Juncus acutiflorus |
| <i>Coleophora sylvaticella</i> Wood, 1892 | II |  | | Luzula luzuloides |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|--|--------------------|
| <i>Coleophora obscenella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I |  13 mm |  | Aster amellus |
| <i>Coleophora virgaureae</i> Stainton, 1875 | II |  (w) 12 mm |  | Solidago virgaurea |
| <i>Coleophora proterella</i> Wikström et Tabell, 2016 | I |  | | Solidago virgaurea |
| <i>Coleophora halophilella</i> Zimmermann, 1926 | I |  14 mm |  | Aster tripolium |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|--|------------------------------------|
| <i>Coleophora therinella</i> Tengström, 1848 | IV |  14 mm | | Fallopia convolvulus, F. dumetorum |
| <i>Coleophora pratella</i> Zeller, 1871 | I |  | | Polygonum bistorta |
| <i>Coleophora linosyris</i> Hering, 1937 | I |  14 mm |  Raupensack <i>Coleophora linosyris</i> | Aster linosyris |
| <i>Coleophora saxicolella</i> (Duponchel, 1843) | IV |  13 mm |  6 mm | Atriplex, Chenopodium |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|-----------------------|
| <i>Coleophora pseudolinosyris</i> Kasy, 1979 | II |  | | Aster linosyris |
| <i>Coleophora motacillella</i> Zeller, 1849 | III |  11 mm |  | Chenopodium |
| <i>Coleophora sternipennella</i> (Zetterstedt, 1839) | IV |  13 mm |  | Chenopodium, Atriplex |
| <i>Coleophora squamosella</i> Stainton, 1856 | I |  Spannweite 11,5 mm |  | Erigeron acris |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|-----------------------|
| <i>Coleophora versurella</i> Zeller, 1849 | IV |  12 mm | | Chenopodium, Atriplex |
| <i>Coleophora jaernaensis</i> Björklund et Palmquist, 2002 | I ? |  | | Chaenopodium? |
| <i>Coleophora subula</i> (Falkovitsh, 1993) | ? |  | | |
| <i>Coleophora dentiferella</i> Toll, 1952 | I |  |  | Caryophylaceae? |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|----------------------|
| <i>Coleophora vestianella</i> (Linnaeus, 1758) | III |  16 mm |  6 mm | Chenopodium, Atripex |
| <i>Coleophora pappiferella</i> Hofmann, 1869 | I ? |  10 mm |  | Antennaria dioica |
| <i>Coleophora filaginella</i> Fuchs, 1881 | I |  10 mm |  | Filago arvensis |
| <i>Coleophora absinthii</i> Wocke, 1877 | I |  13,5 mm |  | Artemisia absinthium |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---------|------------------------|---|
| <i>Coleophora artemisicolella</i> Bruand, 1855 | III | 11,5 mm | | Artemisia vulgaris |
| <i>Coleophora chrysanthemi</i> Hofmann, 1869 | I | | | Tanacetum corymbosum |
| <i>Coleophora odorariella</i> Mühlig et Frey, 1857 | I ? | | | Jurinea cyanoides, J. mollis - minuje listy |
| <i>Coleophora adelogrammella</i> Zeller, 1849 | II | | | Petrorhagia saxifraga, Dianthus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|-----------------------|
| <i>Coleophora succursella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | II |  |  | Artemisia campestris |
| | I |  9,5 mm |  | Helichrysum arenarium |
| <i>Coleophora gnaphalii</i> Zeller, 1839 | I |  17 mm |  | Silene nutans |
| | II |  | | |
| <i>Coleophora galbulipennella</i> Zeller, 1838 | I | | | |
| | II | | | Artemisia campestris |
| <i>Coleophora campestriphaga</i> Baldizzone et Patzak, 1980 | I |  | | |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Coleophora galatellae</i> Hering, 1942 | I |  1 |  | Aster linosyris |
| <i>Coleophora millefolii</i> Zeller, 1849 | II |  12,5 mm |  | Achillea |
| <i>Coleophora scabrida</i> Toll, 1959 | I |  11,5 mm | | <i>Herniaria glabra</i> , <i>H. hirsuta</i> |
| <i>Coleophora peribenanderi</i> Toll, 1943 | III |  13 mm |  | <i>Cirsium</i> , <i>Carduus</i> |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|--|
| <i>Coleophora thymi</i> Hering, 1942 | I |  |  | Thymus |
| <i>Coleophora amellivora</i> Baldizzone, 1979 | I |  12 mm |  | Aster alpinus |
| <i>Coleophora ramosella</i> Zeller, 1849 | II |  13,5 mm |  | Solidago virgaurea, S. canadensis, S. gigantea |
| <i>Coleophora trochilella</i> (Duponchel, 1843) | IV |  15 mm |  | Achillea, Chrysanthemum, Tanacetum... |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|----------------------|
| <i>Coleophora autumnella</i> Duponchel, 1843 | I |  14 mm |  | Aster amellus |
| <i>Coleophora frankii</i> Schmidt, 1886 | I |  10 mm |  | Aster linosyris |
| <i>Coleophora linosyridella</i> Fuchs, 1880 | I |  |  | Aster linosyris |
| <i>Coleophora directella</i> Zeller, 1849 | I |  17 mm |  | Artemisia campestris |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Coleophora expressella</i> Klemensiewicz, 1883 | III |  18,5 mm |  20 mm | Achillea, Artemisia... |
| <i>Coleophora striatipennella</i> (Nylander, 1848) | III |  13 mm | | Cerastium gramineum, Myosoton aquaticus |
| <i>Coleophora solitariella</i> Zeller, 1849 | II |  11 mm |  | Stellaria holostea, Silene nutans |
| <i>Coleophora tanaceti</i> Mühlig, 1865 | IV |  13 mm |  | Tanacetum, Achillea |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|--|---|----------------------|
| <i>Coleophora bornicensis</i> Fuchs, 1866 | II |  |  | Tanacetum vulgare |
| <i>Coleophora albicans</i> Zeller, 1849 | I |  12 mm |  | Artemisia campestris |
| <i>Coleophora argentula</i> (Stephens, 1834) | IV |  9 mm |  | Achillea |
| <i>Coleophora zukowskii</i> Toll, 1959 | II ? | | | Asteraceae? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|------------------------------|
| <i>Coleophora pseudorepentis</i> Toll, 1960 | I ? |  | | Achillea millefolium? |
| <i>Coleophora follicularis</i> (Vallot, 1802) | II |  14 mm |  | Eupatorium, Pulicaria, Inula |
| <i>Coleophora granulatella</i> Zeller, 1849 | I |  11,5 mm |  | Artemisia campestris |
| <i>Coleophora pseudociconiella</i> Toll, 1952 | I |  |  | Polygonum aviculare |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Coleophora adspersella</i> Benander, 1939 | IV |  |  | Chenopodium, Atriplex |
| <i>Coleophora dianthi</i> Herrich-Schäffer, 1855 | I |  | | Dianthus carthusianorum, D. deltoides, srpen až jaro - nejprve v tobolce, později v trubkovitém vaku, kuklí se na tobolce nebo při zemi |
| <i>Coleophora bucovinella</i> Nemeš, 1968 | I |  | | Dianthus pontederae v srpnu - květenství, plodenství |
| <i>Coleophora hackmani</i> (Toll, 1953) | I |  |  | Silene nutans |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|--|---|---|
| <i>Coleophora silenella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | II |  13 mm |  | Silene otites |
| <i>Coleophora nutantella</i> Mühlig et Frey, 1857 | |  19 mm |  | Silene vulgaris, S. nutans |
| <i>Coleophora graminicolella</i> Heinemann, 1876 | I |  15 mm | | Lychnis viscaria, zprvu uvnitř tobolky, kterou shora uzavírá tkanivovým víčkem, aby z ní nevypadala semena, Později v trubicovém vaku na tobolce. |
| <i>Coleophora paradrymidis</i> Toll, 1949 | |  I ? | | Thesium alpinum? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|---|
| <i>Coleophora saponariella</i> Heeger, 1848 | III |  8,5 mm |  | Saponaria officinalis |
| <i>Coleophora paripennella</i> Zeller, 1839 | II |  12 mm |  | Centaurea, Cirsium |
| <i>Coleophora niveistrigella</i> Wocke, 1877 | I |  |  | Gypsophila |
| <i>Coleophora clypeiferella</i> Hofmann, 1871 | IV |  | | Chenopodium - mezi klubíčky, kuklí se v zemi v hedvábném tuhém hnědém zápredu |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|---|---|
| <i>Coleophora binotapennella</i> (Duponchel, 1843) | III |  |  | Chenopodium, Atriplex |
| <i>Coleophora squalorella</i> Zeller, 1849 | III |  |  | Chenopodium, Atriplex |
| <i>Coleophora unipunctella</i> Zeller, 1849 | III |  |  | Chenopodium, nejčastěji Ch. polyspermum |
| <i>Coleophora preisseckeri</i> Toll, 1942 | ? |  | | ? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|--|---|
| <i>Mompha miscella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | Helianthemum |
| <i>Mompha idaei</i> (Zeller, 1839) | II |  | | Epilobium angustifolium - kořen starých rostlin |
| <i>Mompha langiella</i> (Hübner, 1796) | IV |  |  | Epilobium sp. div. - listové miny |
| <i>Mompha terminella</i> (Humphries et Westwood, 1845) | I |  |  | Circaeа - typické listové miny |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|--|
| <i>Mompha raschkiella</i> (Zeller, 1839) | III |  |  | <i>Epilobium angustifolium</i> |
| <i>Mompha locupletella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  |  | <i>Epilobium montanum</i> , <i>E. palustre</i> , <i>E. adenocaulon</i> ... |
| <i>Mompha conturbatella</i> (Hübner, 1819) | II |  |  | <i>Epilobium angustifolium</i> - sepředené terminály |
| <i>Mompha ochraceella</i> (Curtis, 1839) | II |  |  | <i>Epilobium hirsutum</i> - kořenový krček a spodní část lodyhy |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|--|---|
| <i>Mompha lacteella</i> (Stephens, 1834) | III |  | | Epilobium sp. div. - spřádá a minuje listy |
| <i>Mompha propinquella</i> (Stainton, 1851) | III |  | | Epilobium hirsutum, E. montanum, E. palustre - bílé listové miny, které často mění, kuklí se v mině |
| <i>Mompha divisella</i> Herrich-Schäffer, 1854 | II |  |  | Epilobium montanum, E. palustre, E. adenocaulon... - v lodyžních hálkách umístěných při bázi listových řapíků |
| <i>Mompha bradleyi</i> Riedl, 1965 | I ? |  |  | Epilobium hirsutum - v lodyžních hálkách |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|---|
| <i>Mompha confusella</i> Koster et Sinev, 1996 | I ? |  |  | Epilobium hirsutum - v hálkách |
| <i>Mompha sturnipennella</i> (Treitschke, 1833) | II |  | | Epilobium angustifolium ve dvou generacích - na jaře a v létě v lodyžních hálkách na mladých výhoncích, kuklí se mimo, od srpna v tobolkách |
| <i>Mompha subbistrigella</i> (Haworth, 1828) | III |  |  | Epilobium montanum, E. palustre, E. parviflorum, E. adenocaulon - v tobolkách |
| <i>Mompha epilobiella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | IV |  |  | Epilobium sp. div. - sepředené terminály |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|------|---|---|-----------------------------------|
| <i>Pterolonche inspersa</i> Staudinger, 1859 | ? |  |  | Centaurea stoebe - kořenový krček |
| <i>Scythris bengtsoni</i> Patočka et Liška, 1989 | I ? |  11 mm | | xerotermní biotopy |
| <i>Scythris cuspidella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II ? |  | | Helianthemum?, Thymus? |
| <i>Scythris obscurella</i> (Scopoli, 1763) | II ? |  21 mm | | Cerastium arvense |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|--|---|---|
| <i>Scythris cicadella</i> (Zeller, 1839) | I |  | | Scleranthus perennis, S. annuus? |
| <i>Scythris potentilla</i> (Zeller, 1847) | I |  Spannweite 12 mm | | Rumex acetosella |
| <i>Scythris limbella</i> (Fabricius, 1775) | IV |  16 mm |  | Chenopodium, Atriplex |
| <i>Scythris knochella</i> (Fabricius, 1794) | II |  13,5 mm | | Cirsium arvense, prý snad i C. semidecandrum, imága ve květech Thymus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-------|---|---|---|
| <i>Scythris flavidella</i> (Fuchs, 1886) | I ? |  | | Helianthemum? |
| <i>Scythris scopolella</i> (Linnaeus, 1767) | III ? |  |  | živná rostlina není jistá, vycházeje z charakteru biotopů, kde jsou imága chytána, lze předpokládat mechy či lišejníky rostoucí na zemi a skalách - kamenech (např. kamenná moře, sutě) |
| <i>Scythris bifissella</i> (Hofmann, 1889) | I ? |  | | Silene otites |
| <i>Scythris flavidella</i> Preissecker, 1911 | ? |  | | |


| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-------|---|--|---|
| <i>Scythris paulella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | I |  | | Polytrichum piliferum, k nalezení za vlhka, kdy je porost svěží - vypředené chodbičky mezi stélkami |
| <i>Scythris clavella</i> (Zeller, 1855) | II |   | | Helianthemum |
| <i>Scythris seliniella</i> (Zeller, 1839) | III ? |  15 mm |   | Peucedanum oreoselinum, Genista? spíše Artemisia campestris |
| <i>Scythris productella</i> (Zeller, 1839) | I ? |  | | Origanum? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|--|---|---|
| <i>Scythris flaviventrella</i> (Herrich-Schäffer, 1850) | II ? |  | | Vicia? |
| <i>Scythris inspersella</i> (Hübner, 1817) | II |  15 mm |  | Epilobium angustifolium - sepředené terminály |
| <i>Scythris noricella</i> (Zeller, 1843) | I |  |  | Epilobium angustifolium - sepředené listy, květy, plody |
| <i>Scythris gozmanyi</i> Passerin d'Entrèves, 1986 | ? | | | ? |



| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|------------------------|--|
| <i>Scythris picaepennis</i> (Haworth, 1828) | III |   | | Lotus corniculatus, Thymus |
| <i>Scythris disparella</i> (Tengström, 1848) | I |  | | Lathyrus pratensis - vlatní pozorování - Bolevecký rybník v Plzni, bezkolencová louka - první nález pro ČR |
| <i>Scythris laminella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) | II |  | | Rhytidadelphus squarosus - rašelinné louky |
| <i>Scythris palustris</i> (Zeller, 1855) | I |  | | Rhytidadelphus squarosus - rašelinné louky |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|--|--|
| <i>Scythris tributella</i> (Zeller, 1847) | I ? |  | | Securigera varia |
| <i>Scythris siccella</i> (Zeller, 1839) | III |  | | Anthyllis vulneraria, Hieracium pilosella, Ononis spinosa |
| <i>Scythris crypta</i> Hannemann, 1961 | I |  | | Genista pilosa |
| <i>Scythris subcinctella</i> (Bruand, 1851) | I |  |  | Helianthemum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|------------------|
| <i>Scythris braschiella</i> (Hofmann, 1898) | I |  | | Armeria maritima |
| <i>Scythris dissimilella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | II |  | | Helianthemum |
| <i>Scythris fuscoaenea</i> (Haworth, 1828) | II |  | | Helianthemum |
| <i>Scythris fallacella</i> (Schläger, 1847) | I ? |  |  | Helianthemum |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|--|---|--------------------|
| <i>Scythris kasyi</i> Hannemann, 1962 | ? |  14 mm | | |
| <i>Scythris buszkoi</i> Baran, 2004 | IV |  |  | Lycium barbarum |
| <i>Scythris vittella</i> (Costa, 1836) | I |  | | Helianthemum canum |
| <i>Parascythris muelleri</i> (Mann, 1847) | I ? |  | | Thymus? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|------|---|--|--|
| <i>Pancalia leuwenhoekella</i> (Linnaeus, 1761) | III |  | | Viola hirta, V. canina, tykadla s bílým úsekem před koncem |
| <i>Pancalia schwarzella</i> (Fabricius, 1798) | II ? |  | | Viola hirta, V. canina |
| <i>Limnaecia phragmitella</i> Stainton, 1851 | III |  |  | Typha latifolia, T. angustifolia |
| <i>Cosmopterix zieglerella</i> (Hübner, 1810) | II |  |  | Humulus |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|-----|---|--|--|
| <i>Cosmopterix schmidiella</i> Frey, 1856 | II |  |  | Vicia sepium, Lathyrus niger, L. vernus |
| <i>Cosmopterix orichalcea</i> Stainton, 1861 | III |  | | Phalaris arundinacea, Festuca arundinacea, Anthoxanthum odoratum, Milium effusum, Hierochloe odorata, H. austriaca |
| <i>Cosmopterix scribaiella</i> (Zeller, 1850) | II |  |  | Phragmites australis |
| <i>Cosmopterix lienigiella</i> Lienig et Zeller, 1846 | I |  |  | Phragmites australis, mina je často rozšiřována do strany |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|----|---|---|--|
| <i>Pyroderces argyrogrammos</i> (Zeller, 1847) | II |  13 mm | | Carlina, Centaurea, Carduus, Cirsium |
| <i>Pyroderces klimeschi</i> Rebel, 1938 | ? |  11 mm | | ? |
| <i>Stagmatophora heydeniella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1841) | II |  |  | Betonica officinalis - listové miny, hromadně na přízemních listech |
| <i>Eteobalea anonymella</i> (Riedl, 1965) | ? |  12 mm | | ? |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|---|----|---|--|-------------------------------------|
| <i>Eteobalea intermediella</i> Riedl, 1966 | |  15 mm |  14 mm | Linaria vulgaris, Antirrhinum |
| <i>Eteobalea serratella</i> (Treitschke, 1833) | II |  14 mm |  17 mm | Linaria vulgaris |
| <i>Eteobalea tririvella</i> (Staudinger, 1870) | ? |  | | ? |
| <i>Eteobalea albiapicella</i> (Duponchel, 1843) | I |  |  | Globularia - květenství, plodenství |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|---|--|---|
| <i>Isidiella nickerli</i> (Nickerl, 1864) | II |  | | Achillea millefolium, Helichrysum arenarium - sepředené koncové listy |
| <i>Vulcaniella pomposella</i> (Zeller, 1839) | II |  | | Helichrysum arenarium, Hieracium pilosella?, listové miny |
| <i>Vulcaniella extremella</i> (Wocke, 1871) | I |  8,5 mm | | Salvia pratensis, S. nemorosa, Prunella grandiflora |
| <i>Sorhagenia rhamniella</i> (Zeller, 1839) | III |  | makadla především zevně tmavě hnědě skvrnitá, poslední čl. se světlou špičkou, čelo světle hnědé s leskem, 9,5 - 10 mm | Frangula, Rhamnus, nejdříve mezi sepředenými listy, později ve větvičkách |

| Vědecký název | IH | Habitus | Vývojová stadia a jiné | Poznámky |
|--|-----|--|---|---------------------------------------|
| <i>Sorhagenia janiszewskae</i> Riedl, 1962 | III |  | makadla především zevně tmavě hnědě skvrnitá, poslední článek tmavý včetně špičky, čelo šedohnědé nebo žlutohnědé, s leskem, 10,5 - 12 mm | Frangula, Rhamnus, hromadně v západku |
| <i>Sorhagenia lophyrella</i> (Douglas, 1846) | II |  11 mm | poslední článek makadel jednolitě tmavě hnědý, jeho konec s tmavou špičkou, čelo šedohnědé, s leskem, 10,5 - 12 mm | Rhamnus |