










































Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Lotus, Securigera, Cytisus
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	III			Malvaceae
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmansegg, 1804)	I			Sanguisorba minor
<i>Spialia orbifer</i> (Hübner, 1823)	II			Sanguisorba minor









<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	IV			polyfág na bylinách
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	I			Potentilla
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	II			Helianthemum nummularium
<i>Pyrgus trebevicensis</i> Warren, 1926	I	sporný status		









<p><i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)</p>	<p>I</p>			<p>Potentilla</p>
<p><i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)</p>	<p>II</p>			<p>Potentilla</p>
<p><i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)</p>	<p>II</p>			<p>Calamagrostis canescens</p>
<p><i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)</p>	<p>III</p>			<p>Calamagrostis epigejos</p>

<p><i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)</p>	<p>III</p>			<p>Gramineae</p>
<p><i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)</p>	<p>IV</p>			<p>Gramineae</p>
<p><i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>II</p>			<p>Gramineae - Brachypodium pinnatum</p>
<p><i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Gramineae</p>









<p><i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)</p>	<p>IV</p>			<p>Gramineae</p>
<p><i>Zerynthia polyxena</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p><i>Aristolochia clematitis</i></p>
<p><i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>I</p>			<p>Corydalis</p>
<p><i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>ovocné dřeviny</p>









<p><i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758</p>	<p>III</p>		<p>Apiaceae, Dictamnus albus</p>
<p><i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>	 <p>Leptidea sinapis (m) <small>(Gen. Prap. 256)</small></p>	<p>Viciaceae</p>
<p><i>Leptidea juvernica</i> Williams, 1948</p>	<p>III</p>		
<p><i>Leptidea morsei</i> (Fenton, 1881)</p>	<p>I ?</p>		









<p><i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Brassicaceae</p>
<p><i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Crataegus, ovocné stromy</p>
<p><i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Brassicaceae</p>
<p><i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Brassicaceae</p>









<p><i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Brassicaceae</p>
<p><i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)</p>	<p>III</p>			<p>vlevo <i>P. mannii</i>, vpravo <i>P. rapae</i></p>
<p><i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1806)</p>	<p>I</p>			<p>horský druh - <i>Biscutella laevigata</i>, <i>Dentaria atd.</i></p>
<p><i>Pontia edusa</i> (Fabricius, 1777)</p>	<p>IV</p>			<p><i>Sisymbrium</i>, <i>Reseda lutea</i> a další brukvovité</p>



















<p><i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>I</p>			<p><i>Vaccinium uliginosum</i></p>
<p><i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p><i>Securigera varia</i>, <i>Medicago</i></p>
<p><i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905</p>	<p>II</p>			<p><i>Securigera varia</i></p>
<p><i>Colias myrmidone</i> (Esper, 1781)</p>	<p>I</p>			<p><i>Chamaecytisus ratisbonensis</i>, <i>Ch. supinus</i></p>









<p><i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)</p>	<p>IV</p>			<p>Viciaceae</p>
<p><i>Colias erate</i> (Esper, 1805)</p>	<p>IV</p>			<p>Viciaceae</p>
<p><i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Frangula alnus</p>
<p><i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>I</p>			<p>Primula veris</p>









<p><i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>IV</p>			<p>Rumex acetosella</p>
<p><i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1803)</p>	<p>III</p>			<p>Rumex obtusifolius</p>
<p><i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Rumex acetosa, R. thyrsiflorus</p>
<p><i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)</p>	<p>III</p>			<p>Rumex acetosella</p>

<p><i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>II</p>			<p>Rumex acetosa, R. acetosella</p>
<p><i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>I</p>			<p>Rumex acetosa, R. obtusifolius</p>
<p><i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			<p>Prunus domestica, P. spinosa</p>
<p><i>Favonius quercus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Quercus</p>









<p><i>Satyrrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			<p><i>Prunus spinosa</i></p>
<p><i>Satyrrium w-album</i> (Knoch, 1782)</p>	<p>II</p>			<p><i>Ulmus</i></p>
<p><i>Satyrrium spini</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p><i>Rhamnus cathartica</i></p>
<p><i>Satyrrium ilicis</i> (Esper, 1779)</p>	<p>II</p>			<p><i>Quercus robur</i></p>












<p><i>Satyrrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)</p>	<p>II</p>			<p><i>Prunus spinosa</i></p>
<p><i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Dorycnium, Genista, Empetrum, Vaccinium, Erica, Calluna atd.</p>
<p><i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)</p>	<p>III ?</p>			<p><i>Lathyrus sylvestris</i></p>
<p><i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)</p>	<p>II</p>			<p><i>Anthyllis vulnaria</i> - květy, semena</p>









<p><i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)</p>	<p>III</p>			<p>Lathyrus, Trifolium</p>
<p><i>Cupido decolorata</i> (Staudinger, 1886)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Cupido alcetas</i> (Hoffmansegg, 1804)</p>	<p>II</p>			<p>Medicago (lupulina)</p>
<p><i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898</p>	<p>IV</p>			<p>Pelargonium</p>









<p><i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>polyfåg</p>
<p><i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)</p>	<p>I</p>			<p>Thymus</p>
<p><i>Pseudophilotes vicrama</i> (Moore, 1865)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)</p>	<p>I</p>			<p>Sedum</p>















<p><i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)</p>	<p>III</p>		 <p><small>Georges Verhulst</small></p>	<p>Genista tinctoria, Onobrychis</p>
<p><i>Phengaris alcon</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p>Gentiana asclepiadea, G. pneumonanthe, G. crutiata</p>
<p><i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>I</p>			<p>Thymus, Origanum</p>
<p><i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)</p>	<p>I</p>			<p>Sanguisorba officinalis</p>

<p><i>Phengaris nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)</p>	<p>II</p>			<p><i>Sanguisorba officinalis</i></p>
<p><i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			 <p>přední tibia s trnem</p>
<p><i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>III</p>			 <p>přední tibia bez trnu</p>
<p><i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)</p>	<p>III</p>			 <p>přední tibia bez trnu</p>









<p><i>Plebejus optilete</i> (Knoch, 1781)</p>	<p>I</p>			<p><i>Vaccinium uliginosum</i></p>
<p><i>Aricia agestis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p><i>Helianthemum nummularium</i></p>
<p><i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)</p>	<p>I</p>		 <p>Heiner Ziegler</p>	<p><i>Helianthemum nummularium</i></p>
<p><i>Aricia eumedon</i> (Esper, 1780)</p>	<p>II</p>			<p><i>Geranium palustre</i>, <i>G. pratense</i></p>

<p><i>Cyaniris semiargus</i> (Rotenburg, 1775)</p>	<p>II</p>			<p>Trifolium pratense</p>
<p><i>Polyommatus damon</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p>Onobrychis</p>
<p><i>Polyommatus dorylas</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			
<p><i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792)</p>	<p>III</p>			<p>Vicia</p>









<p><i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1834)</p>	<p>II</p>		<p>Onobrychis</p>
<p><i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>IV</p>	 <p><i>Polyommatus thersites</i>      <i>Polyommatus icarus f. icarinus</i>      <i>Aricia agestis</i></p>	
<p><i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)</p>	<p>II</p>		<p>Securigera varia</p>
<p><i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>I</p>		<p>Securigera varia</p>









<p><i>Polyommatus daphnis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p>Securigera varia</p>
<p><i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Viola</p>
<p><i>Argynnis pandora</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Viola</p>
<p><i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Viola</p>









<p><i>Argynnis adippe</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>		
<p><i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>		<p>Viola</p>
<p><i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>		<p>Viola</p>
<p><i>Brenthis daphne</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>		<p>Rubus fruticosus</p>









<p><i>Brenthis hecate</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p>Rubus, Spiraea, Filipendula ulmaria</p>
<p><i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>II</p>			<p>Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis</p>
<p><i>Boloria selene</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Viola palustris, V. riviniana</p>
<p><i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			<p>Viola riviniana, V. hirta</p>



















<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	II			Viola
<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	I			Oxycoccus palustris
<i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1799)	I			Polygonum bistorta
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	III			Salix caprea, S. cinerea, S. purpurea, Prunus cerasifera, Crataegus, Populus tremula









<p><i>Nymphalis xanthomelas</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Salix, Ulmus</p>
<p><i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Betula, Salix, Populus tremula</p>
<p><i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Urtica dioica</p>
<p><i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Urtica dioica</p>









<p><i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Urtica dioica, Parietaria</p>
<p><i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>složnokvěté</p>
<p><i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Ulmus, Humulus, Salix caprea, Urtica dioica</p>
<p><i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Urtica dioica</p>

<p><i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			<p>Salix caprea</p>
<p><i>Apatura ilia</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Salix fragilis, Populus tremula</p>
<p><i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			<p>Populus tremula</p>
<p><i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)</p>	<p>I</p>			<p>Lonicera</p>







<p><i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>I</p>			<p><i>Spiraea salicifolia</i></p>
<p><i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			<p>Veronica, Plantago, Linaria</p>
<p><i>Melitaea phoebe</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p>Centaurea, Cirsium</p>
<p><i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1779)</p>	<p>II</p>			<p>Plantago lanceolata, Stachys recta</p>











<p><i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)</p>	<p>I</p>			<p>Valeriana dioica</p>
<p><i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Valeriana officinalis, Plantago lanceolata, Melampyrum, Knautia arvensis atd.</p>
<p><i>Melitaea britomartis</i> Assmann, 1847</p>	<p>II</p>			<p>Veronica teucrium, V. longifolia</p>
<p><i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850</p>	<p>II</p>			<p>Plantago media</p>











<p><i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			<p>Fraxinus, Plantago, Viola, Salix, Lonicera</p>
<p><i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>I</p>			<p>Succisa pratensis</p>
<p><i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			
<p><i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)</p>	<p>IV</p>			













<p><i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)</p>	<p>II ?</p>			
<p><i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>I</p>			
<p><i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			





















<p><i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764)</p>	<p>I</p>			
<p><i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			





<p><i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			
<p><i>Hyponephele lycaon</i> (Kühn, 1774)</p>	<p>I</p>			<p><i>Festuca ovina</i>...</p>
<p><i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)</p>	<p>II</p>			









<p><i>Erebia ephron</i> (Knoch, 1783)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Erebia sudetica</i> Staudinger, 1861</p>	<p>I</p>			
<p><i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Erebia medusa</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			

<p><i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			
<p><i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Hipparchia hermione</i> (Linnaeus, 1764)</p>	<p>II</p>			





<p><i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Arethusana arethusa</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			
<p><i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)</p>	<p>II</p>			





<p><i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>35 mm</p>		<p>hnízda čmeláků</p>
<p><i>Aphomia cephalonica</i> (Stainton, 1866)</p>	<p>III</p>			<p>duché plody, ovoce</p>
<p><i>Aphomia zelleri</i> Joannis, 1932</p>	<p>III</p>	 <p>23 mm</p>		<p>rostlinné zbytky</p>
<p><i>Aphomia foedella</i> Zeller, 1839</p>	<p>?</p>			





<p><i>Lamoria anella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Achroia grisella</i> (Fabricius, 1794)</p>	<p>III</p>			<p>ve včelích úlech</p>
<p><i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>ve včelích úlech</p>
<p><i>Synaphe bombycalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I ?</p>			







<i>Synaphe antennalis</i> (Fabricius, 1794)	II ?	 <p>31,5 mm</p>		
<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)	IV		 <p>16 mm</p>	roslinné zbytky
<i>Pyralis farinalis</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>20 mm</p>	 <p>26mm</p>	obiloviny ve stavbách
<i>Pyralis regalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 <p>19 mm</p>		















<i>Pyralis perversalis</i> (Herrich-Schäffer, 1857)	II			
<i>Aglossa pinguinalis</i> (Linnaeus, 1758)	IV			polyfág na organickém odpadu v interiéru
<i>Aglossa caprealis</i> (Hübner, 1809)	IV			polyfág na organickém odpadu v interiéru
<i>Aglossa signicostalis</i> Staudinger, 1871	I			





<p><i>Stemmatophora brunnealis</i> (Treitschke, 1829)</p>	<p>I</p>			
<p><i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Listový opad, zbytky rostlinné</p>
<p><i>Hypsopygia rubidalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Hypsopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Rostlinný odpad</p>







<p><i>Endotricha flammealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Rostlinný opad především v doubravách, ale i jinde</p>
<p><i>Endotricha kuznetzovi</i> Whalley, 1963</p>	<p>III ?</p>	<p>Podivný to údaj (Sitek 2015)</p>		
<p><i>Cryptoblabes bistriga</i> (Haworth, 1811)</p>	<p>III</p>			<p>Betula, Alnus, mezi listy</p>
<p><i>Trachonitis cristella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Betula, Prunus spinosa, Euonymus - mezi listy v lehkém zápředku</p>

<p><i>Salebriopsis albicilla</i> (Herrich-Schäffer, 1849)</p>	<p>III</p>	 <p>18 mm</p>		<p>Tilia, Salix - mezi listy</p>
<p><i>Elegia similella</i> (Zincken, 1818)</p>	<p>II</p>	 <p>17mm</p>		<p>Quercus - v malých společenstvích mezi listy</p>
<p><i>Elegia atrifasciella</i> Ragonot, 1887</p>	<p>II</p>	 <p>17 mm</p>		
<p><i>Ortholepis betulae</i> (Goeze, 1778)</p>	<p>III</p>	 <p>23 mm</p>		<p>Betula - přehnutý okraj nebo mezi více listy, kde se i kuklí</p>









<p><i>Pyla fusca</i> (Haworth, 1811)</p>	<p>III</p>	 <p>26 mm</p>		<p>Betula, Vaccinium myrtillus, Salix caprea, Calluna - mezi listy sepředenými s větvičkou</p>
<p><i>Delplanqueia dilutella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II ?</p>			<p>Thymus spp.</p>
<p><i>Delplanqueia inscriptella</i> (Duponchel, 1836)</p>	<p>II ?</p>			
<p><i>Pempeliella ornatella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>	 <p>23 mm</p>		<p>Thymus - v trubce na zemi</p>









<p><i>Catastia marginea</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Sciota fumella</i> (Eversmann, 1844)</p>	<p>?</p>	 <p>22,5 mm</p>		
<p><i>Sciota rhenella</i> (Zincken, 1818)</p>	<p>II</p>	 <p>25 mm</p>		<p>Populus spp. - mezi sepředenými listy</p>
<p><i>Sciota hostilis</i> (Stephens, 1834)</p>	<p>II</p>	 <p>22 mm</p>		<p>Populus spp. - mezi sepředenými listy</p>





<p><i>Sciota adelphella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1836)</p>	<p>II</p>			<p>Salix alba, S. fragilis, méně Populus</p>
<p><i>Selagia argyrella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Calluna - v dlouhých pískem pokrytých hedvábných trubkách, evidentně také na jiných roślinách</p>
<p><i>Selagia spadicella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>IV</p>			<p>Calluna - v dlouhých pískem pokrytých hedvábných trubkách, evidentně také na jiných roślinách</p>
<p><i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke, 1832)</p>	<p>IV</p>			<p>Viciaceae - v luscích</p>







<p><i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>IV</p>	 <p>29mm</p>		<p><i>Lotus corniculatus</i> - mezi sepředenými listy</p>
<p><i>Laodamia faecella</i> (Zeller, 1839)</p>	<p>?</p>	 <p>25 mm</p>		
<p><i>Pempelia palumbella</i> (Denis et Schifferrmüller, 1775)</p>	<p>III</p>	 <p>21,5 mm</p>		<p><i>Calluna</i> - trubka mezi listy a větvičkami</p>
<p><i>Pempelia compositella</i> (Treitschke, 1835)</p>	<p>I</p>	 <p>18,5 mm</p>		



















<p><i>Uncinus obductella</i> (Zeller, 1839)</p>	<p>II</p>	 <p>23 mm</p>		<p>Origanum, Clinopodium, Mentha, Satureja - nakousnutý povadlý terminál</p>
<p><i>Rhodophaea formosa</i> (Haworth, 1811)</p>	<p>III</p>	 <p>18 mm</p>		<p>Vaccinium, Calluna, Betula</p>
<p><i>Dioryctria abietella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Picea abies - šišky, mezi šupinkami trus</p>
<p><i>Dioryctria simplicella</i> Heinemann, 1863</p>	<p>II</p>			<p>Pinus sylvestris - v hálkách po Retinia resinella, ale také v koncových pupenech</p>






<p><i>Dioryctria schuetzeella</i> Fuchs, 1899</p>	<p>III</p>	 <p>(m) 24,5 mm</p>		<p><i>Picea abies</i> - na nejmladších ještě rostoucích výhonech mezi jehlicemi</p>
<p><i>Dioryctria sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840)</p>	<p>II</p>			<p><i>Pinus sylvestris</i>, <i>P. strobus</i>, <i>P. maritima</i> - v zelené kůře, v místech napadení roní pryskyřici, často v místech napadení houbou</p>
<p><i>Phycita roborella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>	 <p>24 mm</p>	 <p>22,5 mm</p>	<p><i>Quercus</i>, mezi listy ve vypředené chodbičce, prý také <i>Malus</i>, <i>Pyrus</i></p>
<p><i>Phycita meliella</i> (Mann, 1864)</p>	<p>I</p>	 <p>26 mm</p>	 <p>24 mm</p>	







<p><i>Hypochoalcia ahenella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>	 <p>24 mm</p>	<p>snad Helianthemum, Artemisia campestris v trubkovitém zápředku, nepravděpodobné jsou informace, že žije mezi listy osiky, vrb, topolů, když jde o stepní druh</p>
<p><i>Hypochoalcia lignella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>I</p>		<p>Bupleurum falcatum - v trubkovitém zápředku na kořenu</p>
<p><i>Hypochoalcia decorella</i> (Hübner, 1817)</p>	<p>II ?</p>		
<p><i>Epischnia prodromella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>II</p>	 <p>26 mm</p>	<p>Centaurea jacea - v jemném předitvu mezi listy při zemi, více housenek společně, odnášejí si kousky listů do předitva, v němž se čile pohybují ve vypředených chodbičkách (Vá)</p>

<p><i>Nepopterix angustella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>III</p>	 <p>19 mm</p>		<p>Euonymus - v plodech</p>
<p><i>Acrobasis dulcella</i> (Zeller, 1848)</p>	<p>I ?</p>			
<p><i>Acrobasis repandana</i> (Fabricius, 1798)</p>	<p>IV</p>			<p>Quercus - jednotlivě na nižších větvích nižších stromů, v listovém zápředku</p>
<p><i>Acrobasis tumidana</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>			<p>Quercus - žije jako A. consociella, ale preferuje stromy, zatímco A. consociella keře</p>









<p><i>Acrobasis marmorea</i> (Haworth, 1811)</p>	<p>II</p>			<p>Prunus spinosa - v trubce z trusu, do něhož jsou zapředeny lístky a větvičky</p>
<p><i>Acrobasis advenella</i> (Zincken, 1818)</p>	<p>IV</p>			<p>Sorbus aucuparia a jiné ovocné dřeviny - Maloidea</p>
<p><i>Acrobasis legatea</i> (Haworth, 1811)</p>	<p>II</p>			<p>Rhamnus - mezi listy terminálu</p>
<p><i>Acrobasis suavella</i> (Zincken, 1818)</p>	<p>III</p>			<p>Prunus spinosa - v trubce z trusu, do něhož jsou zapředeny lístky a větvičky - jako A. marmorea</p>






<i>Acrobasis sodalella</i> Zeller, 1848	I			Quercus - keře, mezi sepředenými listy
<i>Acrobasis consociella</i> (Hübner, 1813)	IV			Quercus - keře, mezi sepředenými listy, pospolitě
<i>Acrobasis fallouella</i> (Ragonot, 1871)	I ?			dříve A. glaucella
<i>Acrobasis obtusella</i> (Hübner, 1796)	III			Pyrus communis






<p><i>Acrobasis dulcella</i> (Zeller, 1848)</p>	<p>I ?</p>	 <p>17 mm</p>		
<p><i>Apomyelois bistratella</i> (Hulst, 1887)</p>	<p>II</p>	 <p>19 mm</p>		<p>Podobná je Glyptoteles leucacrinella</p>
<p><i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)</p>	<p>IV</p>	 <p>22 mm</p>		<p>Jižní ovoce</p>
<p><i>Glyptoteles leucacrinella</i> Zeller, 1848</p>	<p>II</p>	 <p>17 mm</p>		<p>V choroších</p>






<p><i>Episcythrastis tetricella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>	 <p>22,5 mm</p>		
<p><i>Eurhodope rosella</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>II</p>			<p>Scabiosa - květenství a plodenství v srpnu - září</p>
<p><i>Eurhodope cirrigerella</i> (Zincken, 1818)</p>	<p>II</p>	 <p>18 mm</p>		<p>Knautia arvensis - v plodenství, napadená semena se uvolňují z řady, čímž na sebe upozorní. Housenka zde přezimuje.</p>
<p><i>Myelois circumvoluta</i> (Fourcroy, 1785)</p>	<p>III</p>			<p>Cirsium, Carduus - v lodyze</p>














<i>Isauria dilucidella</i> (Duponchel, 1836)	II	 <p>23 mm</p>	 <p data-bbox="1570 153 1968 411">zřejmě různé druhy vikvovitých, <i>Lotus corniculatus</i>. Já choval na <i>Astragalus excapus</i> (Stroupeč). Housenky hromadně v předivu připojeném ke kořenovému krčku, v předivu četné vypředené chodbičky, v nichž se housenky čile pohybují, žerou listy. Kuklí se v předivu.</p>
<i>Gymnancyla canella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 <p>17,5 mm</p>	 <p data-bbox="1570 411 1968 671"><i>Salsola kali</i>, <i>Salicornia</i> - v předivu</p>
<i>Gymnancyla hornigii</i> (Lederer, 1853)	IV	 <p>20 mm</p>	 <p data-bbox="1570 671 1968 932"><i>Atriplex</i> - mezi nažkami</p>
<i>Zophodia grossulariella</i> (Zincken, 1818)	III		 <p data-bbox="1570 932 1968 1187"><i>Ribes nigrum</i>, <i>R. rubrum</i>, <i>R. grossularia</i></p>







<i>Eccopisa effractella</i> Zeller, 1848	IV	 <p>15 mm</p>		Dle Slamky mezi listy opadavých listnáčů.
<i>Assara terebrella</i> (Zincken, 1818)	III			Picea abies - ve zpola rozpadlých šiškách
<i>Euzophera pinguis</i> (Haworth, 1811)	III			Fraxinus - ve zdravé borce, dvakrát přezimuje
<i>Euzophera bigella</i> (Zeller, 1848)	III	 <p>14 mm</p>		Snadno k záměně s G. leucacrinella







<p><i>Euzophera cinerosella</i> (Zeller, 1839)</p>	<p>I</p>			<p>Artemisia absinthium - kořenový krček - pod kůrou</p>
<p><i>Euzophera fuliginosella</i> (Heinemann, 1865)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Euzopherodes charlottae</i> (Rebel, 1914)</p>	<p>I</p>			
<p><i>Nyctegretis lineana</i> (Scopoli, 1786)</p>	<p>III</p>			<p>Artemisia campestris - v předu při zemi mezi lodyhami, snad také Sarothamnus, Ononis</p>

<p><i>Nyctegretis triangulella</i> Ragonot, 1901</p>	<p>III ?</p>			<p>Vnější příčka vyhnuta ven</p>
<p><i>Ancylois cinnamomella</i> (Duponchel, 1836)</p>	<p>III</p>			<p>Globularia?, Sedum acre</p>
<p><i>Ancylois sareptella</i> (Herrich-Schäffer, 1860)</p>	<p>?</p>			
<p><i>Ancylois oblitella</i> (Zeller, 1848)</p>	<p>II</p>			





<p><i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius, 1794)</p>	<p>II</p>			<p><i>Plantago lanceolata</i>, více housenek pohromadě, tamtéž kokon</p>
<p><i>Homoeosoma inustella</i> Ragonot, 1884</p>	<p>?</p>			
<p><i>Homoeosoma nebulella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p><i>Cirsium</i>, <i>Carduus</i> - květenství</p>
<p><i>Homoeosoma nimbella</i> (Duponchel, 1836)</p>	<p>III</p>			<p>Ve květech a semenech <i>Hieracium umbellatum</i>, <i>Solidago</i>, <i>Carlina</i>, <i>Carduus nutans</i>, <i>Aster linosyris</i>.</p>







<i>Phycitodes binaevella</i> (Hübner, 1813)	III	 <p>22 mm</p>		V květenstvích <i>Cirsium tuberosum</i> , <i>Carduus acanthoides</i> , <i>Aster linosyris</i> , <i>Tanacetum vulgare</i> , <i>Artemisia vulgaris</i>
<i>Phycitodes saxicola</i> (Vaughan, 1870)	II	 <p>15,5 mm</p>		<i>Tanacetum vulgare</i> - nápadné zápředky v květenstvích tmavě hnědé s trusem (Vá)
<i>Phycitodes inquinatella</i> (Ragonot, 1887)	II ?	 <p>17,5 mm</p>		
<i>Phycitodes albatella</i> (Ragonot, 1887)	III	 <p>17 mm</p>		<i>Senecio jacobaea</i> , <i>Solidago virgaurea</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Sonchus arvensis</i> - v plodenstvích











<p><i>Phycitodes maritimus</i> (Tengström, 1848)</p>	<p>II</p>	 <p>18 mm</p>		<p>Senecio, Artemisia, Achillea - plodenství</p>
<p><i>Vitula biviella</i> (Zeller, 1848)</p>	<p>I</p>	 <p>(m) 15 mm</p>		
<p><i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)</p>	<p>IV</p>			<p>skladiště</p>
<p><i>Epehstia kuehniella</i> Zeller, 1879</p>	<p>IV</p>	 <p>18 mm</p>		<p>skladiště mouky, obilovin</p>








<p><i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>IV</p>	 <p>17 mm</p>		<p>suchý chleba, suché ovoce atd.</p>
<p><i>Ephestia woodiella</i> Richards et Thompson, 1932</p>	<p>IV ?</p>	 <p>17 mm</p>		
<p><i>Cadra calidella</i> (Guenée, 1845)</p>	<p>III</p>	 <p>19 mm</p>		<p>jižní ovoce</p>
<p><i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)</p>	<p>IV</p>	 <p>16 mm</p>		

















<i>Cadra furcatella</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	III	 <p>18,5 mm</p>		
<i>Cadra figulilella</i> (Gregson, 1871)	IV	 <p>15 mm</p>		suché ovoce
<i>Anerastia lotella</i> (Hübner, 1813)	II	 <p>27 mm</p>		Trávy - v trubkovitém zápředku z písku a trusu
<i>Hypsotropa unipunctella</i> Ragonot, 1888	II ?	 <p>16mm</p>		?







<p><i>Ematheudes punctellus</i> (Treitschke, 1833)</p>	<p>II ?</p>			<p>?</p>
<p><i>Cholius luteolaris</i> (Scopoli, 1772)</p>	<p>?</p>			
<p><i>Scoparia subfusca</i> Haworth, 1811</p>	<p>III</p>			<p>syn.: cembrae</p>
<p><i>Scoparia basistrigalis</i> Knaggs, 1866</p>	<p>IV</p>			





<p><i>Scoparia ambigualis</i> (Treitschke, 1829)</p>	<p>IV</p>			<p>mechy</p>
<p><i>Scoparia ancipitella</i> (La Harpe, 1855)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Scoparia pyralella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			
<p><i>Scoparia ingrattella</i> (Zeller, 1846)</p>	<p>?</p>			

<p><i>Gesneria centuriella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Eudonia lacustrata</i> (Panzer, 1804)</p>	<p>IV</p>	 <p>(m)</p>		<p>mechy</p>
<p><i>Eudonia pallida</i> (Curtis, 1827)</p>	<p>III</p>	 <p>17 mm</p>		<p>mechy na kmenech u vodních toků - ve vlhku (<i>Salix cinerea</i>)</p>
<p><i>Eudonia petrophila</i> (Standfuss, 1848)</p>	<p>II</p>		 <p>18 mm</p>	





<i>Eudonia murana</i> (Curtis, 1827)	II		 23 mm	
<i>Eudonia truncicolella</i> (Stainton, 1849)	IV	 (w) 22 mm		mechy
<i>Eudonia laetella</i> (Zeller, 1846)	II ?	 18,5 mm		
<i>Eudonia sudetica</i> (Zeller, 1839)	II			










<i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758)	IV			mechy
<i>Heliothela wulfeniana</i> (Scopoli, 1763)	III			Mentha (Schutze), Viola arvensis, V. tricolor - v lodyze
<i>Euchromius ocella</i> (Haworth, 1811)	IV			
<i>Chilo phragmitella</i> (Hübner, 1810)	II			Phragmites - stébla rostoucí ve vodě, snadno se odlamují, tam se kuklí









<p><i>Friedlanderia cicatricella</i> (Hübner, 1824)</p>	<p>I</p>			<p>Schoenoplectus lacustris - žlutnoucí lodyhy</p>
<p><i>Calamotropha paludella</i> (Hübner, 1824)</p>	<p>II</p>			<p>Typha latifolia</p>
<p><i>Calamotropha aureliellus</i> (Fischer von Röslerstamm, 1841)</p>	<p>II ?</p>			<p>?</p>
<p><i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			










<i>Crambus pascuella</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>26 mm</p>		
<i>Crambus silvella</i> (Hübner, 1813)	III	 <p>22 mm</p>		
<i>Crambus uliginosellus</i> Zeller, 1850	II	 <p>19.5 mm</p>		
<i>Crambus ericella</i> (Hübner, 1813)	II			














<p><i>Crambus alienellus</i> (Germar et Kaulfuss, 1817)</p>	<p>?</p>	 <p>21 mm</p>		<p>Rhynchospora alba?</p>
<p><i>Crambus heringiellus</i> Herrich-Schäffer, 1848</p>	<p>I</p>	 <p>23 mm</p>		
<p><i>Crambus pratella</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)</p>	<p>IV</p>			







<p><i>Crambus hamella</i> (Thunberg, 1788)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Crambus perlella</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Agriphila deliella</i> (Hübner, 1813)</p>	<p>II</p>	 <p>Spannweite 28 mm</p>	 <p>Spannweite 26 mm</p>	<p><i>Corynephorus canescens</i></p>
<p><i>Agriphila tristella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>		 <p>(m) <i>Agriphila tristella</i> (DENIS &amp; SCHIFFERMÜLLER, 1775)</p>	








<p><i>Agriphila inquinatella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			
<p><i>Agriphila selasella</i> (Hübner, 1813)</p>	<p>II</p>	 <p>(w) Agriphila selasella (HÜBNER, 1813)</p>		<p>Čelo bez kónického hrotu.</p>
<p><i>Agriphila straminella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			
<p><i>Agriphila poliellus</i> (Treitschke, 1832)</p>	<p>II</p>	 <p>Spannweite 23 mm</p>	 <p>Spannweite 19 mm</p>	

<p><i>Agriphila tolli</i> Bleszyński, 1952</p>	<p>?</p>			
<p><i>Agriphila geniculea</i> (Haworth, 1811)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Catoptria permutatellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Catoptria osthelderi</i> (de Lattin, 1950)</p>	<p>II</p>			








<p><i>Catoptria mytilella</i> (Hübner, 1805)</p>	<p>II ?</p>		 <p>21 mm</p>	
<p><i>Catoptria pinella</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>		 <p>23 mm</p>	
<p><i>Catoptria margaritella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II ?</p>			<p>mechy</p>
<p><i>Catoptria fulgidella</i> (Hübner, 1813)</p>	<p>II</p>	 <p>Spannweite 26 mm</p>		<p>písčité biotopy</p>








<p><i>Catoptria maculalis</i> (Zetterstedt, 1840)</p>	<p>II ?</p>			<p>nad hranicí lesa, porosty kleče</p>
<p><i>Catoptria falsella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>		 <p>22 mm</p>	
<p><i>Catoptria confusellus</i> (Staudinger, 1882)</p>	<p>II</p>	 <p>20.5 mm</p>		
<p><i>Catoptria verellus</i> (Zincken, 1817)</p>	<p>II</p>	 <p>18 mm</p>		









<p><i>Catoptria petrificella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>?</p>			<p>horské polohy</p>
<p><i>Catoptria lythargyrella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Xanthocrambus saxonellus</i> (Zincken, 1821)</p>	<p>II ?</p>			
<p><i>Xanthocrambus lucellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)</p>	<p>I ?</p>		 <p>27 mm</p>	 <p>pro srovnání <i>Crambus lathoniellus</i></p>






<i>Chrysocramboides craterella</i> (Scopoli, 1763)	II			
<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	III			mechy
<i>Pediasia fascelinella</i> (Hübner, 1813)	II			na kořenech trav (kostřav na písčitých stanovištích)
<i>Pediasia luteella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			kořeny trav, suchá stanoviště včetně druhotných stanovišť















<p><i>Pediasia truncatellus</i> (Zetterstedt, 1840)</p>	<p>II</p>			<p>Šumava</p>
<p><i>Pediasia contaminella</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Pediasia aridella</i> (Thunberg, 1788)</p>	<p>II</p>			<p>snadno zaměnitelná s <i>P. contaminella</i></p>
<p><i>Platytes cerussella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			







<p><i>Platytes alpinella</i> (Hübner, 1813)</p>	<p>III</p>			
<p><i>Ancylolomia palpella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>	 <p>30 mm</p>	 <p>32 mm</p>	
<p><i>Talis quercella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II ?</p>	 <p>27 mm</p>		
<p><i>Schoenobius gigantella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>	 <p>31mm</p>		<p>Phragmites - ve stéblech, které nakonec uzavřou a s opadnutým stéblem se nechají unášet na hladině k čerstvé stravě.</p>








<i>Donacaula forficella</i> (Thunberg, 1794)	II			Glyceria fluitans, asi Glyceria spp., také Carex, bionomie jako u předchozího
<i>Donacaula mucronella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Carex - kořen
<i>Scirpophaga praelata</i> (Scopoli, 1763)	II			Schoenoplectus lacustris - ve stéblech a kořenech, pod vodou, výletový otvor nad vodou
<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	III			Potamogeton natans - minuje, později mezi dvěma listovými úkrojky, pluje po hladině a nechává se unášet větrem

<i>Elophila manilensis</i> (Hampson, 1917)	IV			zavlečený druh, skleníky, žije podobně jako <i>E. nymhaeata</i> na vodních rostlinách
<i>Elophila difflualis</i> (Snellen, 1882)	IV			zavlečený druh, skleníky, žije podobně jako <i>E. nymhaeata</i> na vodních rostlinách
<i>Acentria ephemerella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Potamogeton spp. atd.
<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	III			Na hladině plovoucí vodní rostliny - Lemna, Potamogeton, Nymphaea atd.







<p><i>Parapoynx stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>	 <p>17 mm</p>	 <p>25 mm</p>	<p>Ponořené a plovoucí rostliny</p>
<p><i>Parapoynx nivalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II ?</p>			<p>neznámo</p>
<p><i>Parapoynx diminutalis</i> Snellen, 1880</p>	<p>IV</p>			<p>vodní rostliny, zavlečený druh</p>
<p><i>Nymphula nitidulata</i> (Hufnagel, 1767)</p>	<p>II</p>	 <p>22 mm</p>		<p>Sparganium v plovoucím úkrytu, snad i na jiných rostlinách s plovoucími listy</p>









<p><i>Aporodes floralis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>IV</p>	 <p>15,5 mm</p>		
<p><i>Cynaeda dentalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p><i>Echium vulgare</i></p>
<p><i>Epascestria pustulalis</i> (Hübner, 1823)</p>	<p>II</p>			<p><i>Anchusa</i> - listová puchýřnatá mina na nejvyšších listech</p>
<p><i>Atralata albofascialis</i> (Treitschke, 1829)</p>	<p>I</p>			<p><i>Inula conyza</i></p>









<p><i>Titanio normalis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>I</p>		<p>Convolvuls arvensis - minuje listy a ukrývá se v dlouhých chodbičkách pokrytých kousky písku a vegetace, hromadně na rostlině na výsušných místech bez vegetace (Vá)</p>
<p><i>Eurrhysis pollinalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>		 <p>Genista spp., Cytisus spp., v záředku u země</p>
<p><i>Evergestis sophialis</i> (Fabricius, 1787)</p>	<p>II</p>		<p>Sisymbrium odoratum atd. mezi květy a semeny</p>
<p><i>Evergestis frumentalis</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>IV</p>		 <p>Sisymbrium atd., mezi květy a semeny</p>









<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Brassicaceae - spodní strana listů, perforují
<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763)	IV			Brassicaceae (Sisymbrium loeselii) - mezi květy a semena
<i>Evergestis limbata</i> (Linnaeus, 1767)	III			Alliaria, Erysimum, Isatis
<i>Evergestis pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	IV			Nejspíše Roprippa amphibia - břehy vodních nádrží
















<p><i>Evergestis politalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>	 <p>18 mm</p>		<p>Biscutella</p>
<p><i>Evergestis aenealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>			<p>Sisymbrium odoratum mezi květy a semeny</p>
<p><i>Hellula undalis</i> (Fabricius, 1781)</p>	<p>III</p>	 <p>18 mm</p>		<p>Brassicaceae</p>
<p><i>Paracorsia repandalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>	 <p>19 mm</p>		<p>Verbascum - v srdíčku od června do května - uvolněná vlna listová</p>









<p><i>Loxostege sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>IV</p>			<p>Artemisia campestris - mezi květy a semeny</p>
<p><i>Loxostege turbidalis</i> (Treitschke, 1829)</p>	<p>III</p>			<p>Artemisia campestris - mezi květy a semeny, také prý Achillea, Aster, Helianthemum</p>
<p><i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>III</p>	 <p>18,5 mm</p>		<p>Lanium, Betonica - spodní strana listů</p>
<p><i>Pyrausta cingulata</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>			<p>Salvia - spodní strana listů, také určitě Thymus</p>








<i>Pyrausta rectefascialis</i> Toll, 1936	II	 <p>14 mm</p>		Salvia pratensis
<i>Pyrausta sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)	II			Thymus - zápredek mezi květy, na písčité půdě, přezimuje v pevném zemním kokonu
<i>Pyrausta castalis</i> (Treitschke, 1829)	II	 <p>16 mm</p>		Satureja, u nás snad Clinopodium vulgare
<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)	IV			Plantago - v srdíčku

<p><i>Pyrausta porphyralis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>	 <p>15 mm</p>		<p>Origanum, Helichrysum</p>
<p><i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>III</p>	 <p>17 mm</p>		<p>Mentha, Origanum atd.</p>
<p><i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>	 <p>17 mm</p>		<p>Prunella, Thymus, Origanum, Mentha</p>
<p><i>Pyrausta ostrinalis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>II</p>	 <p>18 mm</p>		<p>Thymus, Mentha, Nepeta</p>








<p><i>Pyrausta falcatalis</i> Guenée, 1854</p>	<p>I</p>			<p>Salvia glutinosa - listy, květy, v zápředku</p>
<p><i>Pyrausta obfuscata</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>III</p>			<p>Inula conyza, I. hirta</p>
<p><i>Pyrausta nigrata</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>II</p>			<p>Thymus, Origanum, Mentha, Salvia</p>
<p><i>Pyrausta coracinalis</i> Leraut, 1982</p>	<p>I ?</p>			<p>Salvia, Origanum, Clinopodium, alpský druh</p>







<p><i>Uresiphita gilvata</i> (Fabricius, 1794)</p>	<p>II</p>			<p>Genista - společensky na listech v lehkém zápředku</p>
<p><i>Nascia ciliaris</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>II</p>			<p>Cladium mariscus, Carex sp. - širokolisté druhy v porostech vysokých astřic v litorálu vodních ploch</p>
<p><i>Sitochroa palealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Daucus carota - v okolíku</p>
<p><i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>Inula conyza</p>







<p><i>Anania funebris</i> (Ström, 1768)</p>	<p>III</p>	 <p>21 mm</p>		<p>Aster amellus</p>
<p><i>Anania verbascalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Ballota, Teucrium scorodonia</p>
<p><i>Anania fuscalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>			<p>Rhinanthus, Pedicularis</p>
<p><i>Anania lancealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Senecio ovatus, Lycopus, Dipsacus, Eupatorium cannabinum, Stachys sylvatica</p>






<p><i>Anania coronata</i> (Hufnagel, 1767)</p>	<p>IV</p>			<p>Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Sambucus ebulus, Syringa, Calystegia sepium, Fraxinus, Ligustrum</p>
<p><i>Anania stachydalis</i> (Zincken, 1821)</p>	<p>I</p>			<p>Stachys sylvatica</p>
<p><i>Anania perlucidalis</i> (Hübner, 1809)</p>	<p>II</p>			<p>Cirsium arvense - spodní strana listů v lehkém zápředku (Borkovická lada, Dokesko)</p>
<p><i>Anania terrealis</i> (Treitschke, 1829)</p>	<p>III</p>			<p>Solidago virgaurea - zápředek mezi květy, snad také Aster</p>
















<p><i>Anania crocealis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>III</p>			<p><i>Inula conyza</i></p>
<p><i>Anania hortulata</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>			<p>polyfág</p>
<p><i>Sclerocona acutellus</i> (Eversmann, 1842)</p>	<p>II</p>			<p><i>Phragmites australis</i></p>
<p><i>Psammotis pulveralis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>II</p>			<p><i>Mentha aquatica</i> - skeletuje listy, později se zažírání do lodyh</p>







<p><i>Ostrinia palustralis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>II</p>			<p>Rumex aquaticus - kořenový krček a dolní část lodyhy</p>
<p><i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>IV</p>			<p>V lodyze Cannabis, Artemisia, Humulus, Panicum, Zea</p>
<p><i>Ostrinia quadripunctalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>?</p>			<p>?</p>
<p><i>Paratalanta pandalis</i> (Hübner, 1825)</p>	<p>II</p>			<p>Clinopodium, Teucrium</p>








<i>Paratalanta hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	III		Urtica dioica, U. urens, také Verbascum? - vše jsou to pochybné údaje
<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	IV		mezi listy Aster amellus, Eupatorium, Stachys palustris, Stachys sylvaticus, Arctium minus, Fragaria..., migrant
<i>Udea fulvalis</i> (Hübner, 1809)	III		 Salvia pratensis, asi Teucrium chamaedrys, Ballota? (Vá) - mám ji hojně na zahradě každoročně
<i>Udea lutealis</i> (Hübner, 1809)	IV		 Tussilago farfara, Carduus, Rubus fruticosus, Plantago lanceolata, Ranunculus...

<i>Udea elutalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Artemisia vulgaris - sepředené listy do trubky dosahující až na zem
<i>Udea prunalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			polyfág
<i>Udea inquinatalis</i> (Lienig et Zeller, 1846)	II			horský druh
<i>Udea accolalis</i> (Zeller, 1867)	II			Senecio?, Picris hieracioides?, Pulicaria dysenterica?, horský druh






<p><i>Udea alpinalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>			<p>Verathrum album, Chaerophyllum aureum - horský druh</p>
<p><i>Udea nebulalis</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>II</p>			
<p><i>Udea decrepitalis</i> (Herrich-Schäffer, 1848)</p>	<p>II</p>			<p>Dryopteris carthusiana?, Gentiana asclepiadea??</p>
<p><i>Udea olivalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Senecio ovatus</p>









<p><i>Udea hamalis</i> (Thunberg, 1788)</p>	<p>II</p>			<p>Vaccinium, Anemone, Oxalis - v dlouhé trubce mezi listy na stinných místech horského lesa</p>
<p><i>Patania ruralis</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>IV</p>			<p>Urtica, Humulus, Filipendula ulmaria, Parietaria</p>
<p><i>Mecyna flavalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Galium?, Artemisia?, Ballota?, Reseda?</p>
<p><i>Mecyna lutealis</i> (Duponchel, 1833)</p>	<p>II</p>			<p>Galium?, Artemisia?, Ballota?, Reseda?</p>









<p><i>Mecyna trinalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>			<p><i>Helianthemum canum</i></p>
<p><i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)</p>	<p>IV</p>			<p><i>Buxus sempervirens</i>, <i>Pachysandra procumbens</i></p>
<p><i>Agrotera nemoralis</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>III</p>			<p><i>Carpinus</i>, <i>Corylus</i>, <i>Quercus</i>, <i>Castanea</i></p>
<p><i>Diasemia reticularis</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>IV</p>			<p><i>Picris hieracioides</i>. Avšak na čem žije na rašelinných biotopech bez jakýchkoliv dvouděložných rostlin?</p>









<p><i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847</p>	<p>IV</p>	 <p>19 mm</p>		<p>Kalanchoe?</p>
<p><i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)</p>	<p>IV</p>	 <p>29 mm</p> <p><small>Deutschland, Baden-Württemberg, Staatliche Flugwerke, L.F., 23-IV-2013 Mag. Schönm</small></p>		<p>Olea, Jasminum, Ligustrum...</p>
<p><i>Dolicharthria punctalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>polyfág, Artemisia campestris</p>
<p><i>Antigastra catalaunalis</i> (Treitschke, 1829)</p>	<p>IV ?</p>	 <p>17 mm.</p>		<p>Sesamum, Kickxia, Linaria, Antirrhinum,,,</p>



















<p><i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)</p>	<p>IV</p>	 <p>19 mm.</p>		<p>Chaenopodiaceae</p>
<p><i>Metasia ophialis</i> (Treitschke, 1829)</p>	<p>?</p>	 <p>17 mm</p>		
<p><i>Nomophila noctuella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>			<p>Polygonum aviculare, migrant</p>
<p><i>Sufetula boileauae</i> Nell, 2020</p>	<p>IV</p>			<p>Areceaceae</p>









<p><i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>33 mm</p>		<p>Betula, Alnus</p>
<p><i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)</p>	<p>IV</p>	 <p>27 mm</p>		<p>Quercus, Fagus, Alnus, Betula</p>
<p><i>Watsonalla cultraria</i> (Fabricius, 1775)</p>	<p>III</p>	 <p>25 mm</p>		<p>Fagus</p>
<p><i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>32 mm</p>		<p>Betula, Alnus, Quercus, Salix, Populus</p>









<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	II	 <p>28 mm</p>		Alnus
<i>Sabra harpagula</i> (Esper, 1786)	III	 <p>34 mm</p>		Tilia, Quercus, Alnus, Betula
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	III	 <p>22 mm</p>		Prunus spinosa, P. domestica, Crataegus
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>35 mm</p>		Rubus

<p><i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)</p>	<p>III</p>	 <p>39 mm</p> <p><small>Gesamtlänge ca. 39 mm Flügelspann. Oberflächl. 39 mm Körperlänge 12 mm H. Friedrich</small></p> <p><small>Bild 12589</small></p>		<p>Rubus</p>
<p><i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)</p>	<p>II</p>	 <p>34 mm</p> <p><small>Gesamtlänge ca. 34 mm Flügelspann. Oberflächl. 34 mm Körperlänge 10 mm H. Friedrich</small></p> <p><small>Bild 12591</small></p>		<p>vlhká stanoviště, doprovod vodních toků, Populus spp.</p>
<p><i>Tethea or</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>	 <p>36 mm</p> <p><small>Gesamtlänge ca. 36 mm Flügelspann. Oberflächl. 36 mm Körperlänge 11 mm H. Friedrich</small></p> <p><small>Bild 12595</small></p>		<p>Populus tremula, P. nigra, Salix spp.</p>
<p><i>Tetheella fluctuosa</i> (Hübner, 1803)</p>	<p>III</p>	 <p>37 mm</p> <p><small>Gesamtlänge ca. 37 mm Flügelspann. Oberflächl. 37 mm Körperlänge 11 mm H. Friedrich</small></p> <p><small>Bild 12601</small></p>		<p>Populus tremula, Betula</p>









<p><i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>IV</p>	 <p>31 mm</p>		<p>doprovod vodních toků, vlhké lesní porosty, Alnus, Betula, Populus</p>
<p><i>Cymatophorina diluta</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>	 <p>34 mm</p>		<p>jižní části ČR, teplomilné doubravy, Quercus</p>
<p><i>Polyphoca ridens</i> (Fabricius, 1787)</p>	<p>II</p>	 <p>33 mm</p>		<p>xerothermofilní doubravy, Quercus</p>
<p><i>Achlya flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>	 <p>39 mm</p>		<p>Betula</p>









<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>29 mm</p>		Prunus, Quercus, Crataegus, ovocné dřeviny
<i>Malacosoma castrense</i> (Linnaeus, 1758)	II	 <p>30 mm</p>		xerotherofilní, Euphorbia cyparissias hlavně, Artemisia, Fragaria, Rubus, Centaurea, Geranium, Potentilla, Daucus, Sanguisorba minor,
<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>31 mm</p>		polyfágní na listnatých dřevinách
<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	II			jižní Morava, xerotherofilní, Crataegus, Prunus spinosa









<p><i>Eriogaster rimicola</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>	 <p>36 mm</p>		<p>mediteránní, jižní Morava, Quercus pubescens</p>
<p><i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>	 <p>46 mm</p>		<p>Viciaceae</p>
<p><i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>58 mm</p>		<p>polyfág</p>
<p><i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>47 mm</p>		<p>polyfág na bylinách</p>









<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>35 mm</p>		listnaté dřeviny
<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>29 mm</p>		Sorbus, Malus, listnaté dřeviny
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>62 mm</p>		Pinus sylvestris, Picea, Abies
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	III	 <p>52 mm</p>		hygrofilní, širokolisté mokřadní trávy



















<p><i>Cosmotriche lobulina</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>III</p>	 <p>35 mm</p>		<p>ječličnaté lesy, Picea abies, Pinus sylvestris</p>
<p><i>Phyllodesma ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>	 <p>37 mm</p>		<p>vlhké lesy, Vaccinium myrtillus, nízké křoviny - Salix, Populus tremula, Quercus, Prunus spinosa</p>
<p><i>Phyllodesma tremulifolia</i> (Hübner, 1810)</p>	<p>III</p>	 <p>36 mm</p>		<p>listnaté lesy, Quercus, Populus tremula, Betula, Fraxinus</p>
<p><i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>49 mm</p>		<p>Crataegus, Malus, ovocné stromy</p>









<p><i>Gastropacha populifolia</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>	 <p>46 mm</p>		<p>jižní Morava, hygrofilní, topolové luhy podél vodních toků, Populus alba, P. nigra, P. x canadensis, P. tremula</p>
<p><i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>	 <p>49 mm</p>		<p>Prunus domestica, Malus, Pyrus, Crataegus...</p>
<p><i>Lemonia taraxaci</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>II</p>	 <p>44 mm</p>		<p>Taraxacum, Lactuca, Sonchus, Tragopogon</p>
<p><i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761)</p>	<p>II</p>			<p>Hieracium, Taraxacum, Lactuca, Rumex, Plantago, Scabiosa</p>









<p><i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>52 mm</p>		<p>Alnus, Betula, Corylus, Tilia, Carpinus</p>
<p><i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>51 mm</p>		<p>Fagus, Quercus, Tilia...</p>
<p><i>Saturnia pyri</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>IV</p>	 <p>122 mm</p>		<p>mediteránní, jižní Morava, Prunus, Juglans regia,</p>
<p><i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>53 mm</p>		<p>Rubus, Vaccinium, Calluna, Polygonum bistorta, polyfágní</p>

<p><i>Saturnia pavoniella</i> (Scopoli, 1763)</p>	<p>III</p>	 <p>51 mm</p>		<p>Rubus, polyfágní</p>
<p><i>Marumba quercus</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)</p>	<p>I</p>	 <p>92 mm</p>		<p>mediteránní, jižní Morava, Quercus pubescens, Q. cerris</p>
<p><i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>55 mm</p>		<p>Tilia, Ulmus,</p>
<p><i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>71 mm</p>		<p>Salix, Populus, Malus</p>

<p><i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>62 mm</p>		<p>Salix, Populus</p>
<p><i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>103 mm</p>		<p>migrant, Convolvulus, Calystegia sepium</p>
<p><i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>105 mm</p>		<p>migrant, Atropa, Nicotiana, Datura, Solanum</p>
<p><i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758</p>	<p>IV</p>	 <p>92 mm</p>		<p>Syringa, Symphoricarpos, Ligustrum</p>

<p><i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758</p>	<p>IV</p>	 <p>65 mm</p>		<p><i>Pinus sylvestris</i></p>
<p><i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>	 <p>40 mm</p>		<p>Scabiosa, Knautia</p>
<p><i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>III</p>	 <p>43 mm</p>		<p>Lonicera, Symphoricarpos</p>
<p><i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>46 mm</p>		<p>Galium</p>

<p><i>Daphnis nerii</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>IV</p>	 <p>94 mm</p> <p>Griekenland Zygosmifon No. 1034 25.3.1935 E. Friedrich Bild 12378</p>		<p>paleotropický, migrant, Nerium oleander a další mediteránní druhy rostlin</p>
<p><i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)</p>	<p>II</p>			<p>Epilobium, Lythrum, Oenothera</p>
<p><i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>II</p>	 <p>68 mm</p> <p>Germania cent. Das. Jona Thür. Humburg 14.5.1841 E. Friedrich Bild 12381</p>		<p>Euphorbia</p>
<p><i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)</p>	<p>III</p>	 <p>67 mm</p> <p>Germ.c Thür Das. Staufeneck e.L. 13. 1881/20.9.87 E. Friedrich Bild 12389</p>		<p>Galium</p>

<i>Hyles livornica</i> (Esper, 1780)	IV	 <p>78 mm</p> <p><small>Bulgaria - im. Vavilov 1898. 1898 in Krasnodar 230m 48° 47'N E 17° 42' E - 16.07.2008 n.l. E. Friedrich Bild12404</small></p>		migrant, polyfág
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>65 mm</p> <p><small>Germany or Umg. Baden Kaiserh. G. 19.7. - 2.8.1904 E. Friedrich Bild12410</small></p>		Impatiens, Epilobium
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 <p>47 mm</p> <p><small>Germany east. Umg. Jena (Ddr.) Leipzig 22.5.1892 n.l. E. Friedrich Bild12414</small></p>		Galium
<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)	IV ?	 <p>59 mm</p> <p><small>Spain - Katalunja La Farga - 1917 - 1917 1917) Aug 7. 2. Wachsmaier Bild12418</small></p>		paleotropický, migrant, Vitis vinifera, Parthenocissus, atd.